

Will H. Ingham

JANVIER 1908

63.43

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR LE

JARDIN CORREVON

(Jardin alpin d'acclimatation.)

Floraire — Chêne-Bourg, GENÈVE

25^{me} CATALOGUE DE GRAINES

Terrestria sidera, flores.



Graines de plantes alpines . . . 2
» de plantes vivaces d'orne-
ment. 28

Graines d'arbres, d'arbustes de ro-
cailles et pl. grimpantes. 35
» de cactées rustiques . . 38

DU SEMIS

Il est reconnu que les plantes alpines qu'on acclimata par le moyen du semis sont plus florifères et beaucoup plus résistantes à nos climats. Tandis que le 6 % à peine des plantes qu'on arrache dans la nature parvient à fleurir et à se développer dans les jardins, celles élevées de graines réussissent admirablement. Le jardin alpin d'acclimatation, qui a été fondé dans le but d'aider les amateurs et de les pourvoir de graines ou de plantes élevées par semis, donne ici la liste des semences récoltées par lui.

Pour les bien réussir il importe d'observer les conditions suivantes : faire un terreau léger, sablonneux, juste assez nourrissant pour donner les éléments nécessaires à de toutes jeunes plantes. Nous le composons de : un tiers terre de bruyère (peat) ou terreau de feuilles, un tiers terre franche et un tiers de sable.

Le moment le plus favorable à cette opération est l'arrière automne, c'est-à-dire fin Novembre ou commencement de Décembre ou le printemps. Pourtant il est certaines espèces (Anémones du groupe Pulsatille, Edelweiss, Composées et en général les graines munies d'aigrettes et de plumes) qui lèvent mieux si on les sème de suite après leur maturité. Mais dans la grande majorité des cas c'est l'arrière automne ou le premier printemps qu'il faut choisir comme étant la meilleure époque pour les semis.

On sème dans des pots, terrines ou caissettes qu'on draine en remplissant le fond et jusqu'au tiers de leur hauteur, de briques ou de pierres ou bien encore de coke. Il faut avoir soin de très peu recouvrir les graines, surtout celles qui sont très fines. Certaines espèces même, telles que les Saxifragées, les Crassulacées, demandent à n'être pas du tout recouvertes. Ces pots seront placés sous une couche froide, le plus près possible du verre et dès qu'il tombera de la neige, on aura soin de les recouvrir et d'en former un monceau le plus haut possible. On enlève alors les châssis qu'on remet en place lors de la fonte de la neige, ceci pour les semis d'automne.

Dans les pays où la neige fait défaut il est préférable de ne semer qu'en Mars-Avril. Si l'on attend en Mai-Juin pour le faire il serait bon d'ajouter à la composition du sol indiquée plus haut un peu de Sphagnum tamisé dont l'effet modérateur est très avantageux à la germination des graines. Les bonnes pluies chaudes du printemps sont extrêmement favorables à la germination et il faut, le plus possible, exposer les semis à cette action bien-faisante dont ils ne souffriront pas si les pots sont bien drainés.

On peut aussi semer en pleine terre, mais alors il faut avoir soin de surveiller les semis et d'empêcher les mauvaises herbes ou les insectes nuisibles de les détruire.

En général le semis est le même que celui des plantes annuelles ou vivaces les plus délicates ; il n'offre aucune difficulté et réussit bien.

Les genres qui germent le plus rapidement sont les Cistinées, les Violariées, les Crucifères, les Papilionacées ; puis viennent les Composées, les Ombellifères, les Saxifragées, les Crassulacées, etc., etc. Ce sont les Gentianées et les Primulacées qui mettent le plus de temps à germer avec certaines Renonculacées, les Berbéridées, etc.

La germination des graines est, au reste, une chose capricieuse. Il ne faut jamais détruire un semis qui n'a pas levé avant une année pour le moins.

Quand les graines ont germé, et que les plantules commencent à prendre un peu de consistance, c'est-à-dire qu'elles émettent la 2^e et la 3^e feuille au-dessus des cotylédons, il faut les repiquer, dans un terreau qui convienne à la nature de chacune d'elles. Lire à ce sujet notre volume, *Les plantes alpines et de rocailles*.

Espèces montagnardes et de rochers.

Seeds of alpine and mountain plants.

Nous ne donnons pas ici la description des plantes parce que la plupart de nos clients possèdent le petit volume « Plantes alpines et de rocailles et leur culture » par H. Correvon et que, d'autre part, notre catalogue de plantes contient plusieurs de ces descriptions.

Toutes nos semences se vendent au prix de 50 centimes le paquet.

Les personnes que le choix d'une collection embarrassent, peuvent nous abandonner ce soin. Nous faisons des collections de graines d'espèces montagnardes et vivaces aux prix suivants à *notre choix*.

12 espèces pour.	5 francs.
25 » »	10 »
50 » »	20 »
100 » »	40 »

Our seeds are sold to the price of 50 cts. (5 d.) each paquet.

We make collections to our own choice :

12 kinds for	5 francs (4 sh.)
25 » »	10 » (8 sh.)
50 » »	20 » (16 sh.)
100 » »	40 » (32 sh.)

Espèces montagnardes et de rochers.

Pour simplifier, nous avons placé sous cette rubrique les graines reçues du Japon, de l'Himalaya, du Caucase, du Colorado, Canada, des Etats-Unis, du Turkestan, d'Orient, des Canaries, de Nouvelle-Zélande, des Carpathes, de Scandinavie, etc., en ayant soin d'indiquer la source d'où nous les avons reçues. Ces graines là sont généralement en petites quantités et les personnes qui en désirent sont priées d'envoyer leurs commandes le plus tôt possible. Elles ont été récoltées dans le courant de 1907. Les espèces sans indication d'origine ont été récoltées par nous soit à Floraire soit dans les Alpes, en 1907.

Abronia umbellata.

» villosa.

Acæna glabra.

» inermis.

» macrostemma.

» microphylla.

» myriophylla.

» ovalifolia.

» sarmentosa.

» trifida.

Charmantès plantes gazonnantes propres à garnir les rocailles et les sous-bois.

Acantholimon Fomini.

» glumaceum.

» lepturoides.

» libanoticum.

» venustum.

Achillea ageratifolia.

» ageratum.

» albicaulis (Orient).

» atrata.

» Clavenæ.

» crustata.

» Gerberi.

» herba Rota.

» hybrida.

» impatiens.

» in punctata.

» Kretliana.

» lanulosa.

» lingulata var. Buglossis.

» macrophylla.

» mongolica.

» moriziana.

» moschata.

» nana.

» nana \times moschata.

» odorata.

» pectinata.

Achillea pyrenaica.

» Reichardiana.

» rupestris.

» setacea (Orient), belle espèce basse à fl. jaune vif.

» sibirica.

» stricta (Carpathes).

» sudetica.

» tomentosa.

» umbellata.

Aconitum anthora

» barbatum.

» cernuum.

» Columbianum (Etats-Unis).

» decorum.

» japonicum.

» Kuznetsowi.

» lycoctonum.

» » var. japonicum.

» moldavicum.

» napellus.

» » à fl. blanches.

» paniculatum.

» septentrionale (Scandinavie).

» Tauricum.

» uncinatum.

» variegatum.

» » var. album.

Acæta spicata.

» » var. rubra.

Adenophora denticulata.

» liliifolia.

» polymorpha.

» Potanini.

» » à fl. blanches.

Adenostyles albifrons.

» alpina.

» leucophylla.

Adonis vernalis.

Aethionema armenum.

- Aethionema Cappadocicum* (Orient).
 » *cordatum* (*Eunomia cordata*).
 » *coridifolium* (*Iberis jucunda*).
 » *creticum*.
 » *græcum*.
 » *grandiflorum*.
 » *iberideum*, à fl. blanches.
 » *persicum*.
 » *saxatile*.
 » *Thomasianum* (rarissime).
 » *sp. Asie mineure*.

Jolies pl. naines à fl. roses;
 abondante floraison.

Agrostemma coronaria.

Ajuga pyramidalis.

» *genevensis*.

Alchemilla alpina.

» *Lapeyrousei*.

» *pubescens*.

» *vulgaris*.

Alfredia cernua.

» *nivea*.

» *stenolepis*.

Allium moly.

» *neapolitanum*.

» *nipponicum* (Japon).

» *pedemontanum* (Grigna).

» *Schuberti*.

» *Victoriale* (Herbe à neufchemises).

Alopecurus alpinus.

Alsine austriaca.

» *bauhinorum*.

» *gerardi*.

» *juniperifolia*.

» *laricifolia*.

» *liniflora*.

» *pinifolia*.

» *recurva*.

» *Rosani*.

» *tenuifolia*.

» *verna*.

» *villarsii*.

Althæa narbonensis.

Alyssum alpestre.

» *argenteum*.

» *calyocarpum*.

» *creticum* (Chypre).

» *Heinzii*.

» *Mœllendorffianum*.

» *montanum* (Dauphiné).

» *obtusifolium* (Chypre).

» *orientale*.

» *petraeum*.

» *pyrenaicum*.

» *Rochelii*.

» *rostratum*.

» *saxatile*.

» » *var. compactum*.

Alyssum serpyllifolium.

» *sp. Kastania* (Grèce).

» *spinosum*.

» *Wiersbickii*.

» *Wulfenianum*.

Ansonia ellyptica (Japon).

Amsonia latifolia.

» *salicifolia*.

Anaphalis Jedoensis (Jap.).

Andromeda polifolia.

Androsace Brigantiaca.

» *carnea*.

» *chamæjasme*.

» *Charpentieri*.

» *ciliata*.

» *elongata*.

» *filiformis*.

» *glacialis*.

» *Hedreantha*.

» *Helvetica*.

» *imbricata*.

» *lactea*.

» *lactiflora*.

» *Laggeri*.

» *lanuginosa*.

» *obtusifolia*.

» *occidentalis*.

» *Pacheri*.

» *primuloides*.

» *sarmentosa*.

» *septentrionalis*.

» *villosa*.

» *vitaliana*.

Anemone alpina.

C'est la grande et belle anémone
 à fl. blanches des régions alpines.
 On l'élève facilement de graines,
 mais celles-ci germent lentement.

» *apennina*.

» *Baldensis*.

» *canadensis* (Etats-Unis).

» *decapetala*.

» *dichotoma*.

» *globosa* (Etats-Unis).

» *Halleri*.

» *Hepatica*.

» *montana*.

» *multifida*.

» *narcissiflora*.

L'une des plus faciles à cultiver
 mais à germination lente; fl. roses
 en jolis bouquets dressés.

» *nemorosa*.

» *patens*.

» *pratensis*.

» » *var. nigricans*.

» » *var. obsoleta*.

» *pulsatilla*.

Anemone pulsatilla var. *alba*.

- » *ranunculoides*.
- » *rivularis*.
- » *rubra*.
- » *sulfurea*, la belle anémone soufrée.

Anemone sylvestris.

Grande fl. blanche à revers rose ; pl. envahissante et de culture facile.

- » *vernalis* (à fleurs de soie et d'opale).
- » *virginica*.

Angelica ampla.

- » *Archangelica* (*Angélique*).
- » *Gmelini* (Etats-Unis).
- » *Pancicii* (Serbie).

Antennaria alpina.

- » *carpathica*.
- » *dioica*.
- » *monocephala*.
- » *plantaginea*.

Anthemis aetnensis.

- » *aizoon*.
- » *Biebersteini*.
- » *Blancheana*.
- » *carpathica*.
- » *cinerea*.
- » *cotula*.
- » *macedonica*.
- » *montana*.
- » *nobilis* (camomille).
- » *rigescens*.
- » *santolinoides*.
- » *tenuifolia*.
- » *tinctoria*.

Anthericum ramosum. Petit lys blanc.
des rochers, très florifère.*Anthyllis montana*.

- » *vulneraria*.

Antirrhinum asarina.

- » *glutinosum*.
- » *siculum*.

Aphyllanthes monspeliensis.*Apocynum venetum*.*Aposeris foetida*.*Aquilegia alba*.

- » *alpina*.
- » *arctica*.
- » *atropurpurea*.
- » *Baikalensis*.
- » *Bertoloni*.
- » *burgeriana*.
- » *californica*.
- » *canadensis*.
- » *caucasica*.
- » *chrysantha*.
- » *cœrulea* (Floraire).
- » *cœrulea* (Montagnes Rocheuses).
- » *fiabellata*. Blanc pur.

Aquilegia glandulosa (type).

- » » var. *rosea*.

- » *jucunda*.
 - » *lactiflora*.
 - » *longicalcarata*.
 - » *nigricans*.
 - » *Olympica*.
 - » *oxypetala*.
 - » *pyrenaica*.
 - » *skinneri*. Fl. rouge et jaune.
 - » *stenopetala*.
 - » *Stuartii*.
 - » *truncata*. fl. rouge et jaune brillante.
 - » *vulgaris*.
- (voir graines Plantes vivaces).

Les ancolies sont d'excellentes pl. d'ornement, de culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil mais préférant la mi-ombre et la fraîcheur.

Arabis albidula.

- » *alpina*.
- » *arenosa*.
- » *aubrietoides*.
- » *bellidifolia*.
- » *caucasica*.
- » *crispata*.
- » *Halleri*.
- » *hirsuta*.
- » *Holbœlli*.
- » *hybrida*.
- » *japonica* (Jap.).
- » *lucida*.
- » *perfoliata* (Jap.).
- » *petrogena* (Serbie).
- » *pumila*.
- » *rosea*.
- » *soyeri*.
- » *Sudetica*.

Archangelica dahurica.*Arctostaphylos alpina*.

- » *Uva Ursi* (*Raisin d'Ours*).

Arenaria Arduini.

- » *biflora*.
- » *grandiflora*.
- » *Himalayensis*.
- » *hispida*.
- » *Kotschyana*.
- » *lanceolata*.
- » *leptoclados* (Japon).
- » *norvegica*.
- » *purpurascens*.
- » *tetraquetra*.
- » *verna*.

Arenaria sp. Himalaya (Sikk.)*Arisarum vulgare*.*Armeria alpina*.

Armeria cephalotes.

- » Halleri.
- » majellensis.
- » maritima.
- » plantaginea.
- » setacea.
- » sibirica.
- » Suvorosis.
- » vulgaris.
- » Welwitchii.

Arnica chamissonis.

- » latifolia.
- » longifolia.
- » montana (véritable *Arnica*.)

Aronicum carpathicum.

- » Clusii.
- » scorpioides.

Artemisia absinthium.

- » annua.
- » arbuscula (Etats-Unis).
- » argentea.
- » austriaca.
- » campestris.
- » canadense.
- » coerulescens.
- » filifolia (Etat-Unis).
- » frigida (Etats-Unis).
- » glacialis.

Le Genépi des Piémontais.

- » gnaphalioides.
- » granatensis.
- » japonica.
- » lanata.
- » latiloba (Japon).
- » maritima.
- » mutellina (*genépi du Valais*).
- » nana.
- » nevadensis.
- » rupestris.
- » spicata. (*le vrai genépi*).
- » stelleriana.
- » tridentata.
- » valesiaca.
- » Villarsii.

Jolies Composées alpines aromatiques au feuil. finement divisé et généralement blanc d'argent. Soleil.

Arum Dracunculus.

- » italicum.

Asarum canadense.

Asperula odorata (Waldmeister).

- » humifusa.
- » taurina.

Asphodelus albus (Asphodèle).

- » cerasiferus.
- » delphinensis.

Asphodelus fistulosus.

- » palaestinus.
- » ramosus.

Asphodelina cretica.

- » lutea.
- » taurica.

Asplenium marinum.

Aster alpinus.

- » » à fl. blanches.
- » » à fl. roses.

Aster alpinus speciosus.

- » amellus.
- » bessarabicus.
- » canescens (Etats-Unis).
- » Caucasicus.
- » diplostephioides.
- » Fremonti (Etats-Unis).
- » himalaicus.
- » Porteri.
- » Ptarmicoides.
- » pyreneus.
- » Scaber (Japon).
- » sibiricus.
- » Sikkimensis.
- » Tripolium.

Astilbe Davidi.

- » aponica.
- » Lemoinei.
- » rivularis.
- » Thunbergi (Japon).

Astragalus alopecuroides.

- » aristatus.
- » austriacus.
- » cicer.
- » falcatus (Tiflis).
- » glycyphyllos.
- » maximus.
- » monspessulanus.
- » Onobrychis.
- » pseudo-Onobrychis.
- » racemosus.
- » reflexistipulus.
- » vesicarius (Dauphiné).

Astrantia Biebersteinii.

- » carniolica.
- » Caucasica.
- » gracilis.
- » Helleborifolia.
- » major (*Etoile des Alpes*).

Plante très montagnarde et des plus faciles à cultiver.

- » minor.
- » minor. var. rosea.
- » neglecta.
- » pauciflora.

Athamante cretensis.

- » Matthioli.

Atragene alpina.

- Atragene alpina* à fl. blanc pur.
 » » *sibirica*.
Atriplex canescens
 » *rosea*.
Atropa Belladonna (*Belladone*).
 » » à fruits jaunes.
Aubrietia antilibani.
 » *columnæ*.
 » *cretica*.
 » *deltoidea*.
 » *erubescens*.
 » *Eyrii*.
 » *græca*.
 » *Handersonni*.
 » *rosea*.
 Petites Crucifères vivaces for-
 mant des tapis couvert de fl. d'un
 lilas plus ou moins vif suivant
 les espèces.
Audibertia polystachia.
Avena elatior.
 » *argentea*.
 » *flavescens*.
Azalea procumbens.
Ballota spinosa.
Baptisia australis.
 » *exaltata*.
 » *leucantha*.
Bartsia alpina.
Bellidiastrum Michelli.
Bellis annua.
 » *cærulescens*.
 » *perennis* (*Pâquerette*).
Bellium bellioides.
 » *crassifolium* (Corse).
 » *minutum*.
Berardia subcaulis. Pl. très curieuse
 et très rare, récoltée dans la
 station classique du Haut-
 Queyras.
Berkheya purpurea.
Berteroa incana.
Betonica alopecuroides.
 » *grandiflora*.
 » *hirsuta*.
 » *macrostachya*.
 » *officinalis*.
 » » *alba*.
 » *stricta*.
Betula nana.
Bigelowia albicaulis.
 » *graveolens*.
Biscutella lævigata.
 » *lucida*.
Blitum capitatum.
 » *virgatum* (Epinard-fraise).
Bonjeania hirsuta.
Borago laxiflora.
Boykinia aconitifolia.
 » *elata*.
 » *rotundifolia*.
Brassica repanda (Dauphiné).
 » *Richeri*.
Braya alpina.
 » *pinnatifida*.
 » *supina*.
Brichelia grandiflora.
Briza media.
 » » *lutescens*.
Bromus Schraderi.
 » *squarrosus*.
 » *tectorus*.
Bryonia alba.
 » *dioica* (pl. grimpantes).
Bulbocodium vernum.
Bupleurum falcatum.
 » *fruticosum*.
 » *longifolium*.
 » *ranunculoides*.
 » *stellatum*.
Cacalia hastata.
 » *tuberosa*.
Caccinia glauca.
 » *Rauwolfii* (Tiflis).
 » *strigosa*.
Calamintha acynos.
 » *alpina*.
 » *officinalis*.
Calandrinia grandiflora.
 » *pygmæa*.
 » *speciosa*.
 » *umbellata*.
Calla palustris (aquatique).
Caltha alpina.
 » *palustris*.
Callirhoe involucrata.
 » *pedata*.
 » *verticillata*.
Camassia Cusickii.
 » *esculenta*.
Camomille (v. *Anthemis nobilis*).
Campanula abietina.
 » *alliariefolia*.
 » *Allionii*.
 » *alpina*.
 » *barbata*.
 » » à fl. blanches.
 » *Baumgarteni*.
 » *betonicæfolia*.
 » *bononiensis*.
 » *cæspitosa*.
 » *carnica*.
 » *carpathica*.
 » » à fl. blanches.
 » » à fl. lilas clair.
 » » var. *compacta*.

Campanula carpathica var. *Riverslea*.

» » var. *Raineri* (Hort.)

» *caucasica*.

» *caudata*.

» *cervicaria*.

» *collina*.

» *cymbalaria* (Syrie).

» *dahurica*.

» *elatines*.

» *elatinoides*.

Campanula eryocarpa.

» *excisa*.

» *glomerata*.

» » var. *acaulis*.

» » var. à fl. blanches.

» *grandis*.

» » *alba*.

» *Grossekii*.

» *Haylodgensis*.

» *Imeritina*.

» *lactiflora*.

» *lamiifolia*.

» *latifolia*.

» » à fl. blanches.

» *lingulata*.

» *linifolia*.

» *macrorbiza* (des Alpes de Tende).

» *macrantha*.

» » à fl. blanches.

» *michauxioides*.

» *mirabilis*.

» *nobilis*.

» *patula*.

» *pelviformis* (Hort., non Lam.).

» *persicifolia*.

» *petraea*.

» *phytidocalyx* (Tiflis).

» *primulæfolia*.

» *pulla*.

» *punctata*.

» *pusilla*.

» » var. à fl. blanches.

» *Raineri* (vrai).

» » var.

» *rapunculus*.

» *rapunculoides*.

» *rheomboidalis*.

» *rotundifolia*.

» » à fl. blanches.

» » à fl. pleines.

» *Sarmatica*.

» *Saxifraga*.

» *Scheuchzeri*.

» » à fl. blanches.

» *sibirica*.

» *speciosa*.

» *spicata*.

» *stenocodon*.

Campanula strigosa.

» *subpyrenaica*.

» *thyrsoidæa*.

Belle espèce montagnarde à fl. jaunes.

» *tomentosa*.

» *Trachelium*.

» » à fl. blanches.

» » à fl. jaunes.

» *turbinata*.

» » à fl. blanches.

» *tyroliensis*.

» *urticifolia*.

» *Valdensis*.

» *Vanneri*.

» *velutina*.

» *versicolor*.

» *vidali*.

» *villicaulis*.

Les Camp. sont faciles à élever par semis. Les espèces les plus faciles, les plus florifères et les plus jolies sont : *Alliariaefolia*, *carpathica*, *eryocarpa*, *lactiflora*, *persicifolia*, *pusilla*, *sarmatica* et *turbinata*. Les *alliariaefolia* et *nobilis* sont à fl. blanches, *thyrsoidæa* à fl. jaunes et les autres à fl. lilas plus ou moins foncé, sauf leurs var. à fl. blanches. Toutes fleurissent dans l'été, à partir de la fin de mai et sont excellentes pour les rocailles ou la platebande.

Capparis rupestris.

» *spinosa* (Malte).

Cardamine alpina.

» *chenopodifolia*.

» *macrophylla*.

» *resedifolia*.

» *trifolia*.

Carduus aurosicus.

» *defloratus*.

» *nutans*.

» *Personata*.

Carex atrata.

» *Baldensis*.

» *Davalliana*.

» *flava*.

» *gibba*.

» *kyotoensis* (Jap.).

» *maxima*.

» *neurocarpa* (Jap.).

» *nigra*.

Carlina acanthifolia.

» *acaulis*.

Ce sont les superbes chardons d'argent qui, l'automne, animent

les pentes de nos monts, où ils
forment des touff. naines d'une
grande beauté.

Carlina vulgaris.

Cathcartia villosa.

Celsia areturus.

» *Coromandelica.*

» *cretica.*

» *pontica.*

Centaurea axillaris.

» *dealbata.*

» *montana.*

» » à fl. blanches.

» *nervosa.*

» *orientalis* (à fl. jaunes).

» *Phrygia.*

» *præalta.*

» *Ruthenica* (à fl. jaune citron).

» *rutifolia.*

» *spinulosa.*

» *uniflora.*

Centranthus angustifolius.

» *nervosus.*

» *ruber* (*Valériane rouge des murs*).

Cephalaria alpina.

» *tatarica.*

» *uralensis.*

Grandes scabieuses jaunes aux
formes architecturales.

Cerastium album.

» *apenninum.*

» *arvense.*

» *Biebersteini.*

» *chloræfolium.*

Cerastium frigidum.

» *glaciale.*

» *glandulosum* (Jap.).

» *grandiflorum.*

» *illyricum.*

» *lanatum.*

» *lineare.*

» *purpurescens.*

» *tomentosum.*

» *uniflorum.*

» *uralensis.*

» *villosum.*

» *vulgatum.*

Ce sont de petites pl. traînantes
aux innombrables fl. blanches.

Cerinthæ alpina.

Chamæpeuce diacantha.

Cheiranthus Cheiri.

» *mutabilis.*

Chelidonium Franchetianum.

Chenopodium Bonus Henricus.

Cherleria sedoides.

Chicorium Intybus.

» » à fl. blanches.

Chrysanthemum alpinum.

» *atratum.*

» *caucasicum* (Tiflis).

» *coronopifolium.*

» *Decaisneanum* (Jap.).

» *lacustre.*

» *macrophyllum.*

» *maximum.*

» *Nipponicum* (Japon).

» *uliginosum.*

Chrysopsis Bolanderi.

» *foliosa.*

» *villosa.*

Chrysosplenium alternifolium.

» *glaciale.*

Cicuta virosa (*Vraie Ciguë*).

Cimicifuga foetida.

Cineraria aurantiaca.

» *campestris.*

» *suaveolens.*

Circaea Lutetia (pl. d'ombre).

Cirsium Eryophorum.

» *Erysithales.*

» *heretophyllum.*

» *japonicum* (Jap.).

» *monspessulanus.*

» *oleraceum.*

» *rhizocephalum.*

» *Semenowi.*

» *spinosissimum.*

» *Wallichii.*

Cistus (voir gr. arbustes).

Claytonia perfoliata.

» *sibirica.*

Codonopsis sp. Tan Shen.

» *Ussuriensis.*

» *viridiflora.*

Coluteocarpus reticulatus (Orient).

Comarum palustre.

Conringia orientalis (Tiflis).

Convallaria majalis (*Muguet*).

Convolvulus altheoides.

» *cantabricus.*

» *mauritanicus.*

» *Soldanella.*

Coptis anemonoides.

Coriaria myrtifolia.

Coris monspeliensis.

Cornus canadensis.

Coronilla coronata.

» *elegans.*

» *glauca.*

» *montana.*

» *valentina.*

» *varia.*

La jolie coronille lilas et violet.

Corrigiola telephiifolia.

Cortusa Mathioli.

Cortusa Mathioli grandiflora.» *pubens.**Corydalis bulbosa.*» *cheilanthifolia.*» *glauca.*» *incisa* (Jap.).» *lutea.* Très propre à garnir les murailles où il fleurit constamment.» *nobilis.*» *ochroleuca.*» *ophiocarpa.*» *pallida* (Japon).» *sempervirens.*» *tuberosa* (excellente pl. d'ombre).*Cotyledon (Umbilicus) chrysanthus.*» *ciliolatus.*» *globulariæfolius.*» *oppositifolius* (Tiflis).» *platyphyllus.*» *sempervivum.*» *spinosus.**Crassula rubens.**Crepis aurea.*» *blattarioides.*» *incarnata.*» *jubata.*» *montana.*» *pygmæa.*» *sibirica.*» *Terglouensis.**Crocus vernus.**Crucianella stylosa* (fl. roses très abondantes).*Crythmum maritimum.**Cucubalus bacciferus.**Cucurbita perennis.**Cyclamen cilicium.*» *coum.*» *europæum.*» *hederæfolium.**Cynanchum acutum.**Cypella gracilis* (Chili).» *Herberti* (Chili).*Daphne* (voir gr. arbustes).*Datisca cannabina.**Delphinium Ajacis.*» *albescens.*» *Brunonianum.*» *californicum* (Etats-Unis).» *cachemirianum.*» *caucasicum.*» *Cheilantum.*» *chinense.*» *cœruleum.*» *consolida.*» *elatum.*» *Geyeri.**Delphinium grandiflorum.*» *nelsoni.*» *nudicaule.*» *occidentale* (Etats-Unis).» *scapulorum.*» *staphysagria.*» *Tatsience.*» *tirolense.*» *triste*, d'un brun-gris très curieux.» *Zalil* (à fl. jaunes).*Dentaria bulbifera.*» *digitata.*» *laciniata.*» *pinnata.**Dianthus acaulis.*» *alpestris.*» *alpinus.*» *ambiguus.*» *arenarius.*» *aridus* (fl. jaune soufre).» *armeria.*» *atrorubens.*» *barbatus.*» *bicolor.*» *blandus.*» *cæsius.*» *campestris* (Tiflis).» *capitatus.*» *carthusianorum.* Le joli petit œillet rose vif du Valais.» *caryophyllus*» *ciliatus.*» *controversus.*» *corsicus.*» *cruentus.*» *deltoides.*» » *albus.*» *falconeri.*» *fragrans.*» *frigidus.*» *gallicus.*» *giganteiformis.*» *glaucophyllus.*» *glaucus.*» *glutinosus.*» *heptaneurus.*» *hispanicus.*» *hybridus.*» *Holzeri.*» *hispanicus.*» *Hunganicus.*» *hybridus.*» *Lereschei.*» *microlepis.*» *monspessulanus.*» *montanus.*» *neglectus.*» *nitidus.*

Dianthus pallens.

- » *Pancicii*.
- » *pelviformis*.
- » *petræus*.
- » *Plumarius*.

l'une des meilleures pl. à bordure et aussi l'une de celles qui garnissent le mieux les rocs, les sommets des murs, les pentes arides au soleil; flor. prolongée et abondante; fl. très odorantes.

- » *Plumarius* var. *grandiflorus*.
- » " " *floribundus*.
- » " " *hortensis*.
- » " " *maximus*.
- » " " *robustus*.
- » " " *suaveolens*.
- » " " *zonatus*.

Ces variétés d'œillets rampants sont excellentes pour former des bordures, garnir des talus secs, etc.

- » *polycladus* (Liban).
- » *Pontederæ*.
- » *Requieni*.
- » *rupicolus*.
- » *Seguieri*.
- » *speciosus*.
- » *squarrosus*.
- » *strictus* (Grèce).
- » *subacaulis*.
- » *superbus*.
- » " var. *grandiflorus*.
- » " " *nanus*.
- » *sylvestris*.
- » " à fl. blanches.
- » *tenuifolius*.
- » *vaginatus*.
- » *versicolor*.
- » *viscidus*.
- » *wimmeri*.

Les œillets, surtout dans le groupe des *Plumarius*, *squarrosus*, etc., sont excellents pour garnir les lieux arides et ensoleillés; ils se contentent de peu et donnent avec abondance de délicieuses fl. odorantes. Tous s'élèvent facilement de semis.

Dictamnus albus.

- » *Fraxinella*.

Digitalis ferruginea.

- » *grandiflora*.
- » *laevigata*.
- » *lanata*.
- » *lutea*.
- » *Mædia*.
- » *purpurea*.
- » " à fl. blanches.

Ce sont des pl. solides et à flor. prolongée.

Dioscoræa caucasica.

- » *Nipponica* (Jap.).

Diphylleia cymosa.*Dipsacus asper*.

- » *ferox*.

Dodecatheon integrifolium.

- » *Mædia*.

- » " v. *pauciflorum*.

Doronicum austriacum.

- » *caucasicum*.
- » *Columnæ*.
- » *hirsutum*.
- » *Pardalianches*.

Dorycnium herbaceum.

- » *ibericum*. (Orient).
- » *suffruticosum*.

Downingia pulchella (Etats-Unis).*Draba affinis*.

- » *aizoides*.
- » *alpina*.
- » *altaica*.
- » *arabisans*.
- » *armata*.
- » *aurea*.
- » *borealis*.
- » *brunifolia*.
- » *carinthiaca*.
- » *chamæjasme*.
- » *Chionea* (Grèce).
- » *contorta*.
- » *corsica*.

- » *cuspidata*.

- » *Dedeana*.

- » *dychranioides*.

- » *Fladnizensis*.

- » *frigida*.

- » *glacialis*.

- » *Haynaldi*.

- » *hispanica*.

- » *Hoppeana*.

- » *incana*.

- » *Johannis*.

- » *Kotschyi*.

- » *lactea*.

- » *lasiocarpa*.

- » *laxa*.

- » *magelense*.

- » *nivalis*.

- » *olympica*.

- » *oxycarpa* (Liban).

- » *pyrenaica* (*Petrocallis*).

- » *repens*.

- » *rupestris*.

- » *Scandinavica*.

- » *stellata*.

- » *Thomasii*.

Draba tomentosa.

- » *Traunsteineri.*
- » *tridentata.*
- » *turgida.*
- » *Wahlenbergi.*
- » *Zahlbruckneri.*

Dracocephalum argunense.

- » *austriacum.*
- » *canariense.*
- » *integrifolium.*
- » *japonicum.*
- » *Moldavicum.*
- » *nutans.*
- » *peregrinum.*
- » *Ruprechtii.*
- » *Ruyschianum.*
- » *stramineum.*
- » *thymifolium.*

Dryas Drummondii.

- » *integrifolia.*
- » *lanata.*
- » *octopelata (Dryade).*

L'une des plus gracieuses pl.
tapissantes pour rochers; grandes
fl. blanches; graines lèvent bien.

Drypis spinosa.

Echinospermum lapula.

Echium petraeum (Lithospermum petr.).

Edelweiss (Gnaphalium)

Edrayanthus Bosniacus.

- » *caricinus.*
- » *dalmaticus.*
- » *graminifolius.*
- » *tenuifolius.*

Empetrum nigrum.

Ephedra altissima.

- » *distachya.*
- » *monostachya.*

Epilobium abyssinicum (fl. d'un carmin vif).

- » *alpinum.*
- » *anagallifolium.*
- » *angustifolium.*
- » *Fleischeri.*
- » *frigidum.*
- » *glabellum.*
- » *japonicum (Japon).*
- » *luteum.*
- » *nummulariaefolium (Nouv. Zél.).*
- » *pyrrhicholophium (Japon).*
- » *rosmarinifolium.*
- » *trigonum.*

Epimedium pinnatum.

Epipactis palustris.

Eranthis cilicica.

- » *yemalis.*

Eremurus Elwesianus.

- » *Himalaicus.*

Eremurus robustus.

- » *Tauricus.*
- » *turkestanicus.*

Erica carnea.

- » *stricta.*
- » *tetralix.*

Erigeron alpinus.

- » *aurantiacus.*
- » *caucasicus.*
- » *compositus.*
- » *Coulteri.*
- » *elatior.*
- » *erythrocephalus.*
- » *flagellaris.*
- » *glabellus.*
- » *glaucus.*
- » *hybridus roseus.*
- » *leiomerus.*
- » *linifolius (Japon).*
- » *Neo-Mexicanus.*
- » *Philadelphicus.*
- » *pulchellus.*
- » *salsuginosus.*
- » *speciosus.*
- » *umbellatus.*
- » *uniflorus.*
- » *Villarsii.*

Erinus alpinus.

- » à fl. blanches.
- » *hirsutus.*
- » à fl. blanches.
- » *hispanicus.*

Très jolies petites pl. à semer
dans les vieux murs ou les ro-
chers au soleil.

Eriogonum campanulatum.

- » *flavum.*
- » *umbellatum.*

Eriophorum alpinum.

- » *angustifolium.*
- » *latifolium.*
- » *Scheuchzeri.*

Eriophyllum caespitosum.

- » *confertiflorum.*

Eritrichium nanum.

Erodium cheilantifolium.

- » *chrysanthum.*
- » *daucoides.*
- » *hymenodes.*
- » *macradenum.*
- » *Manescavi.*

L'une des meilleures pl. de roc.
fleurissant tout l'été et l'automne
Grandes et belles fl. carmin vif.

Erpetion reniforme.

Eryngium alpinum.

- » *amethystinum.*
- » *autumnalis.*

Eryngium Bourgati. (*Le Chardon bleu des Pyrénées*).

- » *cæruleum.*
- » *campestre.*
- » *creticum.*
- » *giganteum.*
- » *maritimum.*
- » *Olivierianum.*
- » *petiolatum.*
- » *planum.*
- » *Reichardii.*
- » *Rottenbergi.*
- » *serbicum* (Balcans),
- » *Yuccæfolium.*
- » *Zabeli.*

Erysimum Allionii.

- » *Helveticum.*
- » *Kotschyanum.*
- » *leptophyllum.*
- » *nanum.*
- » *ochroleucum.*
- » *odoratum.*
- » *Petrowskianum.*
- » *pulchellum.*

Très jolie pl. rampante, à fl. jaune vif; floraison prolongée; cult. facile.

- » *pumilum.*
- » *purpureum.*
- » *Wahlenbergii.*

Erythræa centaurea.

- » *chloodes.*
- » *gothica.*
- » *latifolia.*
- » *littoralis.*
- » *ramosissima.*

Erythronium Dens Canis (*Dent de Chien*).

Eunomia (*Aethionema*) *cordata.*

Euphorbia aleppica.

- » *altissima.*
- » *Characias.*
- » *Dendroides.*
- » *Gerardiana.*
- » *Lathyris.*
- » *Myrsinites.*
- » *robusta* (Etats-Unis).

Euphrasia alpina.

Eurotia lanata (Color).

Euryangium Sumbul (Orient).

Facchinia lanceolata.

Falcaria latifolia.

- » *Rivini*

Farsetia clypeata.

- » *lunarioides.*

Ferula Asa foetida.

- » *communis.*
- » *glauca.*
- » *narthex.*

Ferula Sadleriana.

- » *Sumbul.*

Grandes ombellifères au feuillage finement décoré et hautement décoratives.

Festuca crinum-Ursi. (*Crin d'ours*).

- » *elegans.*
- » *glauca.*
- » *spadicea.*
- » *valesiaca.*
- » *violacea*

Petits gazons des montagnes à feuillage fin.

Fragaria elatior (Jap.).

- » *indica.*

Francoa appendiculata.

- » *racemosa.*
- » *sonchifolia.*

Frankenia pulveralenta.

Frasera speciosa (Color.).

Fritillaria Impérialis.

- » *Meleagris* à fl. blanches.
- » *delphinensis* (de la station classique du Queyras).

Gagea Liotardi.

Galanthus nivalis.

Galium purpureum.

- » *tenue.*

Gauracoccinea.

Gaya simplex.

Genista voir *Arbustes.*

Gentiana acaulis.

L'une des meilleures pl. des Alpes : germination lente mais sûre.

- » *alba* (d'Amérique).

Gentiana alpina.

- » *amarella* (annuelle).
- » *Andrewsi* (d'Amérique).
- » *angulosa.*
- » *angustifolia.*
- » *asclepiadea.*
- » » à fl. blanches.

- » *bavarica.*

- » *Bigelowi* (d'Amérique).

- » *brachyphylla.*

- » *brevicens.*

- » *Burseri.*

- » *campestris* (annuelle).

- » *Clusii.*

- » *cruciata.*

- » *dahurica.*

- » *depressa.*

- » *Favrati.*

- » » à fl. rouges.

- » *Fetisowii.*

- » *frigida.*

- » *germanica* (annuelle).

Gentiana imbricata.

- » *Kesselringii.*
- » *Kochiana.*
- » *lutea.*
- » *macrophylla.*
- » *Moorcroftiana.*
- » *nivalis* (annuelle).
- » *Olivieri.*
- » *pannonica.*
- » *parryi* (d'Amérique).
- » *phlogifolia.*
- » *Pneumonanthe.*
- » *Przewalsky.*
- » *punctata.*
- » *purpurea.*
- » *pyrenaica.*
- » *recurvata* (Sikk.).
- » *Rocheliana.*
- » *Saponaria* (Color.).
- » *septemfida.*
- » *serrata* (Etats-Unis).
- » *Sikkimensis* (Sikk.).
- » *straminea.*
- » *suecica.*
- » *Thomasiana.*
- » *Tibetica.*
- » *verna.*
- » *v. alba.*
- » *v. atrocœrulea.*
- » *v. azurea.*
- » *v. grandiflora.*
- » *Walujevii.*

Geranium aconitifolium (*rivulare*).

- » *abortivum.*
- » *albanum.*
- » *albiflorum.*

Geranium argenteum.

- » *armenum.*
- » *Bohemicum.*
- » *carolinianum.*
- » *cinereum.*
- » *Endresii.*
- » *Fremonti.*
- » *grandiflorum.*
- » *Grevilleanum.*
- » *Ibericum.*
- » *lucidum.*
- » *macrorhizum.*
- » *nepalense.*
- » *nodosum.*
- » *palustre.*
- » *phaeum.*
- » *platypetalum.*
- » *pratense.*

Excellente plante pour rochers et plates-bandes fleurissant tout l'été.

- » *Richardsoni.*

Geranium Robertianum album.

- » *sanguineum.*
- » » à fl. blanches.
- » *striatum.*
- » *sylvaticum.*

Gerbera Anandria.

- » *Kunzeana.*

Geum Borissii.

- » *Bulgaricum.*
- » *Chilcense* (à fl. rouge très vif).
- » *coccineum* (des Balcons).
- » *Heldreichii.*
- » *heterocarpum.*
- » *intermedium.*
- » *japonicum* (Jap.).
- » *montanum.*
- » *pyrenaicum.*
- » *reptans.*
- » *rivale.*
- » *Rhæticum.*
- » *Rossii.*
- » *strictum* (Japon).
- » *tyrolense.*

Gilia cornopifolia (Color.).

Gillenia trifoliata.

Globularia cordifolia.

- » *alypum* (Provence).
- » *nana.*
- » *nudicaulis.*
- » *vulgaris.*

Glaucium luteum.

- » *rubrum.*
- » *tricolor.*

Glossocomia Clematidea.

Glycyrrhiza uralensis.

Gnaphalium Leontopodium (*Edelweiss*).

Gnaphalium japonicum (Jap.).

- » *multiceps.*
- » *norvegicum.*
- » *supinum.*
- » *sylvaticum.*

Gratiola officinalis.

Gunnera manicata.

Gutierrezia Euthamiae. Jolie pl. vivace

naine et basse, affectant la forme d'un arbuste touffu et se couvrant de fl. jaune vif de juillet en novembre.

Gymnadenia albida.

- » *conopea.*

Gypsophila cerastioides.

- » *mangini.*
- » *repens.*
- » *Stevani.*

- » *trichotoma.*

Hacquetia Epipactis.

Haplocarpha Leichtlini.

Harboureia trachypleura.

Hedysarum boreale.

- » *denticulatum.*
- » *elongatum.*
- » *multijugum.*
- » *neglectum.*
- » *obscurum.*
- » *Semenowi.*
- » *sibiricum.*

*Heimia myrtifolia.**Helianthella quinquænervis.**Helianthemum alpestre (jaune).*

- » *amabile (rose).*
- » *apenninum (blanc).*
- » *atrosanguineum (rouge grenat).*
- » *bicolor (jaune et rouge).*
- » *canum (jaune).*
- » *coccineum.*
- » *cruentum (rouge vif).*
- » *Fumana (jaune).*
- » *grandiflorum (jaune).*
- » *lutescens (jaune pâle).*
- » *mutabile (de plusieurs teintes).*
- » *celandicum (jaune).*
- » *polyfolium (blanc).*
- » *purpureum (carmin vif).*
- » *roseum (rose clair).*
- » *rubrum (rouge sombre).*
- » *rupifragum.*
- » *sanguineum (rouge vif).*
- » *sulfureum (soufre).*
- » *tomentosum (à feuilles blanc., fl. jaun.).*
- » *vulgare (jaune).*

Ce sont des pl. à gracieux feuil.
persistant, aux fl. nombreuses; se
succédant presque toute l'année
quand on a soin de couper les
tiges après la fleur; culture très
facile. Pl. naines et touffes, excell.
pour les rochers et talus arides.
Lèvent facilement et vite.

Helichrysum angustifolium.

- » *arenarium.*

Helleborus fœtidus.

- » *colchicus.*
- » *niger (Rose de Noël).*
- » *viridis.*

*Heracleum alpinum.**Heracleum giganteum.*

- » *lanatum (Etats-Unis).*
- » *Mantegazzianum.*

Les gr. de cet *Heracleum* nous
ont été apportées du Caucase en
1892. C'est une pl. superbe, gi-
gantesque, et dont la description
dans le « Nuove Giornale botanico
italiano », vol. II, avril 1895,
donne à peine une idée suffisante

bien que l'auteur attribue au
moins 10,000 fleurs à sa large om-
belle que porte une hampe de 2 à
3 mètres de haut. C'est une bonne
pl. viv., propre à isoler dans les
pelouses, de culture extrêmement
facile et à forte odeur anisée.

Heracleum montanum.

- » *orientale.*
- » *persicum.*
- » *pubescens.*
- » *pyrenaicum.*
- » *villosum.*

Herniaria glabra.

- » *hirsuta.*
- » *incana.*
- » *pyrenaica.*

Hesperis nivea.

- » *sibirica.*
- » *tristis.*

Heuchera sanguinea.

Délicieuse saxifragée des mon-
tagnes du Mexique, aux fl. roses
vif et se succédant de mai en
août.

*Hibiscus Trionum.**Hieracium albidum.*

- » *aurantiacum.*
- » *Bornmülleri (d'Orient).*
- » *lanatum.*
- » *præaltum.*
- » *penanthoides.*
- » *stoloniferum.*
- » *villosum.*

*Hippocrepis comosa.**Hladnicka golacensis.**Homogyne alpina.**Horminum pyrenaicum.**Hugueninia tanacetifolia.**Hydrocotyle vulgaris.**Hydrophyllum virginicum.**Hypericum Androsæum.*

- » *Ascyron.*
- » *aureum.*
- » *calycinum.*
- » *Coris.*

Hypericum densiflorum.

- » *elegans.*
- » *erectum (Jap.).*
- » *Gebleri.*
- » *japonicum (Jap.).*
- » *Kotschyannum.*
- » *montanum.*
- » *nepalense (Sikk.).*
- » *nummulariæfolium.*
- » *Orientale.*
- » *organifolium.*
- » *patulum (Japon).*

Hypericum perforatum (Millepertuis).

- » *poliphyllum*.
- » *prolificum* (Etats-Unis).
- » *quadrangulum*.
- » *repens*.
- » *Rhodopeum*.
- » *Richeri*.
- » *Scouleri*.
- » *tomentosum*.

Hypochaeris Helvetica.

- » *maculata*.

Hyssopus officinalis.

- Pl. très aromatique, à fl. bleu foncé.
- » *officinalis* à fl. blanches.
- » » à fl. rouges.
- » *sp.* Asie centrale.

Iberis carnosa.

- » *commutata*.
- » *gibraltarica*.

Belle et bonne pl. à fl. se succédant pendant une bonne partie de l'année.

- » *Jordani*.
- » *jucunda* (*Aethionema*).
- » *saxatilis*.
- » *semperflorens*.
- » *sempervirens*.

L'une des meilleures pl. à rocailles et bordures; fl. blanc pur, de mai en juillet; effet éclatant.

- » *stylosa*.
- » *Taurica*.
- » *Tenoreana*.

Impatiens glanduligera.*Imperatoria angustifolia*.

- » *ostruthium*.

Inula ensifolia.

- » *glandulosa*.

Sorte d'*Arnica* à très grandes fl. originaire du Caucase.

- » *Helenium*.
- » *japonica* (Jap.).
- » *macrocephala*.
- » *montana*.
- » *Thapsoides*.

Inula viscosa.*Iris* (voir pl. *vivaces*).*Isatis alpina* (vraie, récoltée dans le Haut-Queyras, sa station classique).

- » *tinctoria*.

Jasione Jankæ.

- » *montana*.
- » *perennis*.

Jeffersonia diphylla.*Juncellus nipponicus*.*Juncus decipiens* (Jap.).

- » *Leschenaulti* (Jap.).
- » *pauciflorus* (Jap.).

Juniperus (voir *arbustes*).*Kneria saxatilis*.*Knautia arvensis alba*.*Kœhleria valesiaca*.*Krynitskia Jamesi* (Colorado).

- » *virgata* (Colorado).

Lactuca denticulata (Jap.).

- » *perennis*.

Lamium album.*Lappa major*.*Laserpitium gallicum*.

- » *halleri*.
- » *hispidum*.
- » *latifolium*.
- » *nitidum*.
- » *peucedanoides*.
- » *siler*.

Grandes Ombellifères au feuillage ornemental.

Lasiagrostis Calamagrostis.*Lathyrus alatus*.

- » *heterophyllus*.
- » *incurvus*.
- » *latifolius*.
- » *maritimus*.
- » *montanus*.
- » *pyrenaicus*.
- » *roduntifolius*.

Lavandula spica.

- » *Stœkas*.

- » *vera*.

- » » var. à fl. blanches.

Leontopodium alpinum (Edelweiss).

Semer dans un sol léger et tenir plutôt sec; repiquer jeune et cultiver au soleil et dans sol calcaire.

Diviser tous les deux ans.

- » *altaicum*.
- » *Himalayense*.
- » *japonicum*.
- » *sibiricum*.
- » *transylvanicum*.

Lepidium alpinum (*Hutschinsia*).

- » *Auerswaldii*.

Leucojum æstivum.

- » *vernum*.

Levistichum officinale.*Liatris montana* (voir pl. *vivaces*).*Libanotis montana*.*Ligularia macrophylla*.

- » *sibirica*.
- » *turkestanica*.

Lilium candidum.

- » *chalcedonicum*.
- » *cordifolium* (Jap.).
- » *croceum*.
- » *dahuricum*.
- » *dalmaticum*.

Lilium giganteum (Sikk.).
 » *Glehni* (Jap.).
 » *Grayi* (Etats-Unis).
 » *japonicum* (Jap.).
 » *Martagon* (excellent pour les sous bois).
 » » à fl. blanches.
 » » *Cattaniæ*.
 » *pomponium*.
 » *superbum*.
 » *tigrinum*.

Linaria alpina.
 » » à fl. roses.
 » » concolor.
 » *anticaria*.
 » *cilicica*.
 » *cymbalaria*.
 » » à fl. blanches.
 » » compacta.
 » *dalmatica*.
 » *genistifolia*.
 » *hepaticæfolia*.
 » *italica*.
 » *macedonica*.
 » *origanifolia*.
 » *pallida*.
 » *Pancicii*.
 » *petræa* (voisin d'*alpina*).
 » *purpurea*.
 » *spuria*.
 » *striata*.
 » *tristis*.

Lindelofia spectabilis.

Linnæa borealis.

Linum alpinum.

- » *austriacum*.
- » *campanulatum*.
- » *cartharticum*.
- » *flavum*.
- » *maritimum*.
- » *multiflorum*.
- » *narbonense*.
- » *perenne*.
- » » à fl. blanches.
- » *sibiricum*.
- » *tenuifolium*.

Les *Linum alpinum*, *perenne* et *sibiricum* sont de charmantes esp. à fl. bleu d'azur, fleurissant très longtemps. Culture facile.

Liparis Læselii.

Lithospermum angustifolium.

- » *graminifolium*.
- » *longiflorum*.
- » *multiflorum*.
- » *officinale*.
- » *oleoides*.
- » *petræum*.

Lithospermum purpureo-cæruleum.

Lloydia serotina.

Lobelia Deckenii.

Nouvelle pl. des montagnes africaines.

» *sessiliflora* (Jap.).

» *tenuior* (voir pl. vivaces).

Lonicera (voir *arbustes alpins*).

Lophanthus anisatus.

Lubinia lubinoides (Jap.).

Lunaria rediviva.

Luzula campestris.

» *lutea*.

» *nivea*.

» *spadicea*.

» *sylvatica*.

Lychnis alpina.

» » à fl. blanches.

» *flos Jovis*. Fl. de *Jupiter*.

» » à fleurs blanches.

» *fulgens*.

» *Lagascæ*.

» *Preslii*.

» *Lieboldi*.

» *viscaria*.

Jolie Caryophyllée rose carmin

vif facile à élever de graines.

» *viscaria* à fl. blanches.

» à fl. roses.

Lynosiris punctata.

» *vulgaris*.

Lysimachia barostachys (Jap.).

» *ciliata*.

» *clethroides*.

» *ephemerum*.

» *fortunei* (Jap.).

» *japonica* (Jap.).

» *kindigeri* (Balcans).

» *luzulioides* (Jap.).

» *punctata*.

» *thyrsiflora*.

» *verticillata*.

» *vulgaris*.

Lythrum roseum.

» *Salicaria*.

» *speciosum*.

» *virgatum*.

Malabaila, sp. *Magaspoleon* (Grèce).

Malva alcea.

» *crispa*.

» *verticillata* (Jap.).

Mandragora officinalis.

» *vernalis*.

Margyricarpus setosus.

Marrubium candidissimum.

» *velutinum*.

Matthiola fenestralis.

» *fragrans*.

Matthiola pedemontana.

- » *sinuata.*
- » *valesiaca.*

Mayanthemum bifolium.

Meconopsis cambrica.

(Pavot jaune.) Cette pl. est excellente pour les lieux frais et ombragés.

Meconopsis cambrica à fl. orangé.

- » *heterophylla.*
- » *Nepalensis.*
- » *petiolata.*

Malandrium rubrum (à fl. roses).

Melica altissima.

- » *ciliata.*
- » *nutans.*
- » *uniflora.*

Melissa officinalis.

Mentha japonica.

- » *piperita.*
- » *Pulegium.*
- » *tomentosa.*
- » *velutina.*

Menyanthes trifolia (trèfle d'eau).

Mertensia ciliata.

- » *lanceolata.*
- » *paniculata (sibirica).*

Meum athamanticum.

L'une des plus fines verdures qu'on puisse imaginer.

- » *Mutellinum.*

Michauxia campanuloides.

Micromeria filiformis.

- » *græca.*
- » *Juliana.*
- » *rupestris.*

Mimulus Burnetii.

- » *cardinalis.*
- » *luteus.*
- » *primuloides.*

Miscanthus sinensis (Jap.).

Mitella diphylla.

Mœhringia Iankæ.

- » *muscosa.*
- » *pendula.*
- » *sedoides* (de Tende).

Molospermum cicutarium.

Molucella spinosa.

Morine longifolia.

- » *persica.*

Mulgedium alpinum.

- » *Bourgaei.*
- » *plumieri.*
- » *tartaricum.*

Muscari comosum.

Myosotis alpestris (fl. bleu pur).

- » *lithospermifolia.*
- » *palustris*, bleu d'azur.

Myosotis pal. var. semperflorens.

- » *pyrenaica.*
- » *rupicola.*
- » *Welwitschii.*

Myrrhis odorata.

La Myrrhe, dont les racines sont fortement anisées.

Nardus stricta.

Nepeta Camphorata.

- » *Cataria.*
- » *kokkamirica.*
- » *macrantha.*
- » *menthoides.*
- » *Mussini.*
- » *Nepetella.*
- » *nuda.*

Nigritella angustifolia.

Nymphæa alba.

Nuphar luteum.

Omphalodes Luciliæ.

Oenothera arguta.

- » *cæspitosa.*
- » *densiflora.*
- » *Fraseri.*
- » *fruticosa.*
- » *mejor.*
- » *Howardi.*
- » *macrocarpa.*

L'une des meilleures plantes de rocailles ; grandes fl. jaune clair, de juin en novembre.

- » *nivea.*
- » *pallida.*
- » *pumila.*
- » *Sellowii* (Calif.)
- » *serrulata.*
- » *speciosa.*
- » *undulata* (Patagonie).

Omphalodes Luciliæ.

Onobrychis montana.

- » *petræa.*
- » *saxatilis.*

Ononis cenisia.

- » *fruticosa.*
- » *natix.*
- » *rotundifolia.*
- » *variegata* (Abruzzes).

Onopordon bracteatum.

- » *acanthium.*
- » *illyricum.*
- » *Siebthorpium.*

Grands chardons aux feuil. argentées.

Onosma Bourgæi.

- » *Helveticum.*
- » *stellulatum.*

Ophiopogon japonicum.

- » *Wallichianum.*

Opuntia (voir *Cactées rustiques*).

Origanum vulgare.

» *pulchrum*.

Ornithogalum pyrenaicum.

» *tenuifolium*.

Orobus luteus.

» *niger*.

» *tuberosus*.

» *vernus*.

Osbeckia nutans.

Ostrowskya magnifica.

Oxalis acetosella.

Oxybaphus nictaginus.

Oxyria digyna.

» *elatior*.

Oxytropis Baïkalensis.

» *campestris*.

» *foetida*.

» *Halleri*.

» *Jacquini*.

» *Laponica*.

» *montana*.

» *ochroleuca*.

» *pilosa*.

» *sulfurea*.

Pæderota chamæmelifolia.

Pæonia (voir *pl. vivaces*).

Papaver alpinum.

» *alpinum* var. à fl. rouge vif, rouge cinabre, roses et jaunes.

Ces pavots alpins sont d'entre les plus florifères, les plus gracieuses et les meilleures des pl. de roc. Leurs fleurs, très abondantes, affectent toutes les teintes. On peut les semer dans les rochers, les graviers, les fentes de murs et les lieux pierreux. Sol maigre et rocailleux.

» *alpino-nudicaule*.

» *atlanticum*.

» *caucasicum*.

» *croceum*.

» » var. du Saïran-Nor.

» *Heldreichii*.

» *nudicaule*.

» » à fl. blanches.

» » » jaune vif.

» » » rouges.

» » » rouge cromoisi.

» » » roses.

» » » soufrées.

» » » striée jaune et rouge

» *nudicaule*. Toutes teintes mélang.

Le pap. nudicaule est l'une des plus florifères et des plus précieuses d'entre les pl. alpines ou vivaces. Il aime la fraîcheur et la

mi-ombre et constitue l'un des meilleurs ornements des rochers. Fleurit tout l'été et jusqu'en hiver, très facile à cultiver; bon pour la fl. coupée.

Papaver oreophyllum.

» *orientale*.

» *pilosum*.

» *pyrenaicum*.

» *radicatum*.

» *Rhæticum*.

» *Rhæas* (coquelicot).

» *rupifragum*.

» *spicatum*.

» *strictum*.

Paracaryum angustifolium.

» *coelestinum*.

» *heliocarpum*.

Paradisيا liliago.

» *liliastrum*. Lis de St-Bruno; facile à élever.

» *Liliastrum major*.

Pardanthus chinensis.

Paris quadrifolia.

Parnassia alpina.

» *palustris*.

Paronychia argentea.

» *Kapelaë*.

» *nivea*.

Parrya Menziesii.

Patrinia rupestris.

» *heterophylla*.

» *villosa*.

Pedicularis atrorubens.

» *Barrelieri*.

» *foliosa*.

» *tuberosa*.

» *verticillata*.

Pl. parasites à semer avec du gazon.

Peganum Harmala.

Peltaria alliacea.

» *emarginata* (Grèce).

Penthorum chinensis (Jap.).

» *sedoides*.

Pericome caudata.

Petalostemon candidus.

» *tenuifolius*.

Petasites albus.

» *japonicus* (Jap.).

» *niveus*.

Peucedanum austriacum.

» *angustifolium*.

Phaca alpina.

» *astragalina*.

» *australis*.

» *frigida*.

Phleum alpinum.

Phlomis fruticosa.

Phlomis rigida.

- » *Samia*.
- » *tuberosa*.

Phlox acuminata.

- » *Douglasi*.
- » *fruticosa*.
- » *maculata*.
- » *reptans*.

Phygelius capensis.*Physalis alkengi*.

- » *Francheti*.
- » *lobata* (Color.).

Physaria dydimocarpa.*Physochlaina orientalis*.

- » *physaloides*.

Phyteuma austriaca.

- » *betoniæfolium*.
- » *carestiæ*.
- » *charmeli*.
- » *comosum*.
- » *globulariæfolium*.
- » *hemisphæricum*.
- » *limonifolium*.
- » *Micheli*.
- » *nigrum*.
- » *orbiculare*.
- » *pauciflorum*.
- » *Scheuchzeri*.
- » *Scorzonerifolium*.
- » *serratum*.
- » *spicatum*.

Picrorhiza Kurrooa (Sikk.).*Pinguicula alpina*.

- » *grandiflora*.
- » *Reuteri*.
- » *vulgaris*.

Plagius ageratifolius.*Plantago alpina*.

- » *cynops*.
- » *fuscescens* (Queyras).
- » *hirtella*.
- » *montana*.
- » *Patagonica*.
- » *sericea*.

Platycodon (voir *pl. vivaces*).*Pleurospermum austriacum*.

- » *uralensis*.

Poa alpina.

- » *cæsia*.
- » *violacea*.

Podophyllum Emodi.

- » *peltatum*.

Polemonium cœruleum.

Pl. mellifère, éminemment propre à orner un jardin; fl. bleues très odorantes et se succédant sur la pl. de juin à septembre.

Polemonium confertum.*Polemonium dissectum*.

- » *flavum*.
- » *foliossissimum*.
- » *grandiflorum*.
- » *Hymalayense*.
- » *humile*.
- » *mellitum*.
- » *pauciflorum*.
- » *reptans*.
- » *Richardsoni*.
- » *Tanguticum*.

Les Polémoines sont d'admirables pl. viv., formant de jolies touff. d'une verd. fine et gaie, et portant de beaux panicules de fl. bleues, blanch. ou jaunes, odorantes.

Polygala chamæbuxus.*Polygonatum giganteum* (Etats-Unis).

- » *multiflorum*.
- » *verticillatum*.
- » *vulgare*.

Polygonum alpinum (Queyras).

- » *amplexicaule*.
- » *Bistorta*.
- » *angustifolia*.
- » *Brunonis*.
- » *capitatum*.
- » *cuspidatum* (Jap.).
- » *lanigerum*.
- » *molle*.
- » *Sieboldi*.
- » *villosum*.
- » *virginianum*.
- » *viviparum*.

Potentilla abschasicæ.

- » *adjarica*.
- » *alchemilloides*.
- » *alpestris*.
- » *ambigua*.
- » *argentea*.
- » *arguta* (Color.).
- » *argyrophylla*.
- » *astrakanica*.
- » *atrosanguinea*. Fleur d'un rouge ardent.
- » *aurea*.
- » *Baldensis*.

Potentilla Bornmülleri.

- » *calabra*.
- » *caulescens*.
- » *chinensis* (Jap.).
- » *chrysantha*.

Jolie fl. jaune clair.

- » *cinerea*.
- » *Clusiana*.
- » *delphinensis*.
- » *Fenzlii*.

Potentilla fragarioides (Jap.).

- » fragiformis.
- Belle espèce à feuillage velouté, se bronzant à l'automne.
- » frigida.
- » fruticosa (*Potentille en arbre*).
- » glandulosa.
- » grandiflora.
- » Guntheri.
- » Hippiana.
- » Hookeriana.

Potentilla hypoleuca (Jap.).

- » Kleiniana (Jap.).
- » Kurdica.
- » montenegrina.
- » multifida.
- » Nepalensis.

Superbe esp. à fl. rose tendre veinées de carmin.

- » nitida.
- » nivalis.
- » nivea.
- » pedemontana.
- » peduncularis.
- » pulcherrima.
- » pyrenaica.
- » recta.
- » rivalis (Etats-Unis).
- » rupestris.
- » Salesowiana.
- » sibbaldi (Sikk.).
- » speciosa.
- » sulfurea.
- » tenacetifolia.
- » tridentata.
- » tuberosa.
- » valesiaca.
- » Visiani.

Pratia angulata.

- » begoniifolia.

Prenanthes purpurea.**Primula acaulis.**

- » var. à fl. bleues.
- » algida.
- » Allionii (Tende).
- » Arctotis.
- » auricula (type).

Primula Balbisii.

- » Bellunensis.
- » Berninae.
- » Boveana.
- » capitata (vrai, bleu foncé).
- » carniolica.
- » cashmeriana.
- » ciliata.
- » Clusiana.
- » commutata.
- » confinis.

Primula cortusoides (cult. fac.; jolies fl. carmin).

- » Cottia.
- Espèce superbe provenant des Alpes vaudoises du Piémont.

- » denticulata.

Primula denticulata, var. à fl. blanches.

- » deorum.
- » discolor.
- » elatior.
- » Facchini.
- » farinosa.
- » floribunda (non rusti. chez nous).
- » frondosa.
- » glaucescens.
- » glutinosa.
- » grandis.
- » hirsuta.
- » integrifolia.
- » intricata.
- » japonica.

L'une des plus robustes, les hampes florales portent plusieurs tiges de fl. du carmin le plus vif. Elle aime l'humidité.

- » japonica à fl. blanches.
- » latifolia.
- » longiflora.
- » luteola.
- » macrocalyx.
- » magellanica.
- » marginata.
- » minima.
- » mollis.
- » obconica (non rustique).
- » oenensis.
- » officinalis.

Fl. jaune orangé vif, odorantes, esp. très propre à émailler les prés et les pelouses.

- » Parryi.
- » pedemontana.
- » Portæ.
- » Potenschlagiana.
- » Rhætica.
- » rosea.

Du rose le plus vif qui se puisse rêver.

- » scottica.
- » Sieboldi.
- » variétés horticoles.
- » Sikkimensis.
- » spectabilis (Trentin).
- » variabilis (les belles var. anglaises).
- » venusta.
- » veris (les meilleures var. anglaises).
- » verticillata.
- » villosa.

Primula viscosa.
 La jolie Primevère carmin des
 Alpes granitiques.
 » *Vochinensis.*
 » *Warei.*
Primula Wulfeniana.
Prunella alba.
 » *grandiflora.*
 » *laciniata.*
Psoralea macrostachya.
 » *tenuifolia (Color.).*
Pterocephalus Parnassi.
Pulmonaria angustifolia.
 » *rubra.*
Putoria calabrica.
Pyrethrum argenteum.
 » *dumosum (Tiflis).*
 » *macrophyllum.*
 » *myriophyllum (Tiflis).*
 » *Tschihatscheffii.*
Pyrola uniflora.
Ramondia alba.
 » *pyrenaica.*
 » *serbica.*
Ranunculus aconitifolius.
 Excellent pour lieux frais et
 ombragés.
 » *alpestris.*
 » *amplexicaulis.*
 » *anemonoides.*
 » *brevifolius.*
 » *carinthiacus.*
 » *caucasicus.*
 » *crenatus (Trentin).*
 » *glacialis.*
 » *graminæus.*
 » *hybridus.*
 » *Illyricus.*
 » *japonicus (Jap.).*
 » *Lingua (aquat.).*
 » *majellensis (majella).*
 » *millæfoliatus.*
 » *montanus.*
 » *oresphyllus (Grèce).*
 » *parnassifolius.*
 » *pyrenæus.*
 » *rutæfolius.*
 » *Seguieri.*
 » *Thora.*
 » *Trautellneri.*
Reseda canescens.
 » *complicata.*
 » *fruticulosa (Reseda en arbre).*
Rhaponticum cinarioides.
 » *Heleniifolium (Dauphiné).*
 » *pulchrum.*
Rhazia orientalis.
Rhodiola linifolia.

Rhodiola ovata.
 » *rubra.*
Rhodiola rosea (Sedum Rhodiola).
 » *scopoli.*
Rhododendron chamæcistus.
 » *ferrugineum (La Rose des Alpes).*
 » » *à fl. blanches.*
 » *hirsutum.*
 » *intermedium.*
 » *Kamtschaticum.*
 » *Kotschy.*
Rodgersia podophylla.
 » *tabularis.*
Rodhea japonica.
Romanzoffia Sitchensis.
Roripa pyrenaica.
Rosa (voir arbustes).
Rubus arcticus.
 » *mutkanus.*
 » *saxatilis.*
Ruellia ciliosa (Etats-Unis).
Rumex alpinus.
 » *flexuosus (Nouv. Zélande).*
 » *fueginus (Sud Patagonie).*
 » *Hydrolapatum (aquat.).*
 » *occidentalis.*
Ruta angustifolia.
 » *Chalepensis.*
 » *graveolens.*
 » *patavina.*
Salix chilensis (Chili).
 » *pentanda.*
 » *reticulata.*
 » *retusa.*
 » *serpyllifolia.*
Salpichroma rhomboidea.
Salvia acaulis.
 » *æthiopis.*
 » *argentea.*
 » *austriaca.*
 » *azurea.*
 » *glutinosa (sauge à fl. jaunes).*
 » *grandiflora.*
 » *Horminum (bractées colorées).*
 » *Hyans.*
 » *japonica (Jap.).*
 » *mellifera.*
 » *Nipponica (Jap.).*
 » *officinalis.*
 » » *major.*
 » » *à fl. blanches.*
 » *pratensis.*
 » » *à fl. blanches.*
 » » *bicolor.*
 » *Przewalskyi.*
 » *ringens.*
 » *Sclarea.*
 » *spathacea.*

Salvia sylvestris.» *verbenacea.*» *verticillata.**Samolus Valerandi.**Sanguinaria canadensis.**Sanguisorba canadensis.*» *dodecandra.*» *japonica* (Jap.).» *tenuifolia* (Jap.).*Sanicula europea.**Santolina rosmarinifolia.**Saponaria bellidifolia.*» *cæspitosa.*» *glutinosa.*» *lutea.*» *ocymoides.*» » *v. splendens.*

La sap. ocym. est l'une des meilleures des pl. de rocailles; elle croît au soleil, retombe gracieusement et se recouvre, en mai-juillet, de nombreuses fl. roses.

» *officinalis.*» *pulvinaris* (Syrie).*Saponaria Vaccaria* (annuelle),*Satureya montana.*» *intermedia.*» *pygmæa.**Sauromatum guttatum.**Saussurea alpina.*» *albescens.*» *decurrens.*» *depressa.*» *discolor.*» *pygmæa.**Saxifraga aconitifolia.*» *aizoides.*» *Aizoon.*» » *à fl. rose vif.*» *ajugæfolia.*» *altissima.*» *anceps.*» *androsacea.*» *aphylla.*» *aspera.*» *atropurpurea.*» *angustana.*» *australis.*» *Balcana.*» *biflora.*» *Blavii.*» *bronchialis.*» *bryoides.*» *bulbifera.**Saxifraga Burseriana.*» *cæsia.*» *cæspitosa.*» *canaliculata.**Saxifraga carpathica.*» *cartilaginea.*» *cernua.*» *cervicornis.*» *cochlearis.*» *coniferæ.*» *controversa.*» *coriophylla.*» *corymbosa.*» *Cortyledon.*» » *× aizoon.*» *crassifolia.*» *crustata.*» *cuneata.*» *cuneifolia.*» *Cymbalaria* (annuel. à fl. jaunes).» *cymosa.*» *decipiens.*» *diapensioides.*» *diversifolia.*» *exarata.*» *Ferdinand-Coburgi.*» *flavescens.*» *Friedrich-Augusti.*» *geranioides.*» *Geum.*» *Gibraltarica.*» *globulifera.*» *Grisebachii* (Serbie).» *Heucherifolia.*» *Hieracifolia.*» *Hirculus.*» » *var. grandiflora.*» *Huetti.*» *hypnoides.*» *intacta.*» *integrifolia.*» *Iratiana.*» *irrigua.*» *juniperina.*» *Kolenatiana.*» *lanceolata.*» *lasiophylla.*» *leucanthemifolia.*» *longifolia.*» *longifolio × pyramidalis.*» *luteo viridis.*» *marginata.*» *media* (*calyciflora*).» *moschata.*» *muscoides.*» *mutata* (fl. orangé vif).» *nervosa.**Saxifraga nivalis.*» *ohioensis.*» *oppositifolia.*» » *grandiflora.*» *pedatifida.*

Saxifraga pedemontana.

- » peltata.
- » pensylvanica.
- » planifolia.
- » Prostii.
- » pseudo-sancta.
- » pubescens.
- » punctata.
- » pyramidalis.
- » Rhei.
- » retusa.
- » rivularis.
- » rosea.
- » rosularis.
- » rotundifolia.
- » Salomoni.
- » sancta.
- » sarmentosa.
- » scardica.
- » Segueri.
- » serratifolia.
- » sponhemica.
- » squarrosa.
- » stellaris.
- » stenopetala.
- » sturmiana.
- » Tellimoides.
- » tenella.
- » tricuspidata.
- » trifurcata.
- » tridactylites.
- » umbrosa (*Désespoir du peintre*).
- » Valdensis.
- » Valdensis major.
- » Vandelli.
- » varians.
- » virginica.
- » whitlawi.
- » zimmereri.

Germent avec facilité, mais à cause de l'extrême ténuité de leurs graines, il faut soigner les semis et ne pas arroser trop fort. Il est bon de ne pas recouvrir les gr. et de semer à la surface du sol.

Scabiosa agrestis.

- » alba.
- » caucasica.
- » alba.
- » graminifolia.
- » japonica (Jap.).
- » lucida.
- » à fl. blanches.
- » lyratifolia (fl. grenat vif).
- » ochroleuca.

Schivereckia Bornmülleri.

- » podolica.

Scilla autumnalis.

- » campanulata.

Scilla japonica.

- » patula.
- » sibirica.

Scirpus Nipponicus (Jap.).

Scleranthus perennis.

Scorzonera austriaca.

Scrophularia alata (Jap.).

- » juratense.
- » Marylandica (Etats-Unis).
- » pyrenaica.
- » vernalis.

Scutellaria alpina.

- » à fl. blanches.

La Scut. alp. est une excel. pl. trainante à fl. bleu filas et blanc chez le type, très robuste et florifère.

- » altissima.
- » Baikalensis.
- » orientalis.

Sedum acre.

- » aizoon.
- » album.
- » altissimum.
- » anacampseros.
- » annuum.
- » asiaticum (Sikk.).
- » atratum.
- » Brownii.
- » carpathicum.
- » dasyphyllum.
- » Douglasi.
- » elegans.
- » Ewersii.
- » fabaria.
- » Forsterianum.
- » Hispanicum.
- » himalayense (Sikk.).
- » kantschaticum.
- » lyidium.
- » magellense.
- » maximum.
- » micranthum.
- » middendorffii.
- » olympicum.
- » oppositifolium.
- » oreganum.
- » pallidum.
- » populifolium.
- » Pottsi.
- » purpurescens.
- » reflexum.
- » Rhodantum.
- » rupestre.
- » Sempervivum (vrai).
- » sexangulare.

Sedum spectabile.

- *spurium.*
- *stenopetalum (Color.)*

Sedum stoloniferum.

- *telephium.*
- *ternatum.*
- *turpidum.*
- *turkestanicum.*
- *villosum.*
- *wallichianum.*

*Selliera radicans.**Sempervivum acuminatum.*

- *alpinum.*
- *arachnoideum.*
- *arvernense.*
- *bungeanum.*
- *boutignianum.*
- *comoli.*
- *Fauconnetti.*
- *flagelliforme.*
- *funkii.*
- *gaudini.*
- *gaudini hybrida.*
- *heuffeli.*
- *hirtum.*
- *hispidulum.*
- *holochrysum.*
- *Juratense.*
- *mettenianum.*
- *montanum.*
- *patens.*
- *Reginae-Amaliæ.*
- *Requienii.*
- *robustum.*
- *Seguieri.*
- *tectorum.*
- *triste.*

Senecio abrotanifolius.

- *adonidifolius.*
- *ætnensis.*
- *alpinus.*
- *aurantiacus.*
- *campestris.*
- *carniolicus.*
- *cordatus (très florifère, grande esp. à fl. jaune brillante).*
- *coriaceus.*
- *diversifolius.*
- *doronicum.*

C'est le beau « *Soleil d'or* » des Alpes, à capitules oranges : pl. très brillante et aimant le soleil et la rocaille.

- *Douglasi (Etats-Unis)*
- *incanus.*
- *jacquinianus.*
- *macrophyllus.*
- *mortoni (Himal.)*

Senecio nebrodensis.

- *nemorensis.*
- *paludosus.*
- *procerus.*
- *pulcher.*
- *quinquæligulatus.*

Senecio salicetorum (Lorraine).

- *sarracenicus.*
- *stenocephalus.*
- *subalpinus.*
- *Thapsoides (Grèce).*
- *tyrolense.*

Serratula coronata (Jap.).

- *radiata.*
- *Vulpii.*

Seseli caespitosa.

- *gummifer.*

Sibbaldia cuneata.

- *maxima.*
- *parviflora.*
- *procumbens.*

Sidalcea candida.

- *malvæflora.*

Sideritis hyssopifolia.

Jolie Labiée naine et touffue à fl. jaune soufre.

Silene acaulis.

- » à fl. blanches.
- *alpestris.*
- *alpina.*
- *armeria (annuelle)*
- *asterias (fl. en capitules, d'un rouge ardent).*
- *biflora.*
- *bryoides.*
- *ciliata.*
- *correvoniana.*
- *elisabethæ.*
- *exscapa.*
- *fimbriata.*
- *flavescens.*
- *Friwaldskiana.*
- *fruticulosa.*
- *Græfferi.*
- *Kitaibeliana.*
- *Lerchenfeldiana.*
- *libanotica.*
- *melandriiformis.*
- *monachorum.*
- *multicaulis.*
- *nutans.*
- *odontopetala rubra (Liban).*
- *otites.*
- *petræa.*
- *pseudo-otites.*
- *pumilio.*
- *pusilla.*
- *quadrifida.*

Silene reichenbachiana.

- » *rupestris.*
- » *saxifraga.*
- » *Schafta.*

L'une des rares pl. saxatiles d'automne ; fl. d'un carmin vif : cult. facile.

- » *sp. Delphes (Grèce)*

Silene valesia.

- » *virginica.*
- » *viscosa.*
- » *zawadsky.*

Sissimbrium strictissimum.

Sissirinchium angustifolium (Color).

- » *anceps.*
- » *chilense (Patagonie).*

Smilacina racemosa.

- » *stellata.*

Soldanella alpina.

- » *montana.*
- » *pyrolæfolia.*

Solenanthus apenninus.

Solidago alpestris.

- » *canadensis.*
- » *gracilis.*
- » *missouriensis (Etats-Unis).*
- » *nana (Etats-Unis).*
- » *puberula.*
- » *reflexa.*
- » *Riddeli.*
- » *rigida (Etats-Unis).*
- » *rigidiscula.*
- » *rugosa.*
- » *serotina (Color).*
- » *Shortii.*
- » *spectabilis (Etats-Unis).*

Sorbaria stellipila.

Specularia Speculum.

Spigelia Marylandica (Etats-Unis).

Spiræa Aruncus.

La superbe Reine des bois aux grands panicules blancs.

- » *filipendula.*
- » *Ulmaria.*

Stachys lanata.

- » *plumosa.*

Statice arborescens (Ténériffe).

- » *brassicaeformis (id.).*
- » *fruticans (id.).*
- » *imbricata (id.).*
- » *macrophylla (id.).*
- » *macroptera (id.).*
- » *puberula (id.).*
- » *hybrida (id.).*

Espèces rares, quelques-unes rarissimes, reçues de leurs stations d'origine.

Statice Gmelini.

Statice latifolia.

- » *Limonium.*
- » *Suworowi.*

Stipa gigantea.

- » *pennata.*

Stobæa radula.

- » *membranifolia.*

Streptopus amplexifolius.

Suæda fruticosa.

- » *glauca (Jap.).*

Swertia bimaculata (Jap.).

- » *conuata.*
- » *longifolia.*
- » *perennis.*

Symphiantra Hoffmanni.

Campanulacée à fl. blanches, très florif. et propre à garnir les lieux frais.

- » *pendula.*

Tamus communis.

Bonne pl. grimpante propr. aux lieux ombrag. aux sous-bois, etc., se garnissant de baies écarlates à l'aut.

Tanacetum vulgare.

Telekia speciosa.

Très belle Composée à grandes formes et à capitules orangés, fleurissant d'août en oct.

Telephium Imperati.

- » *orientale.*

Tellima grandiflora.

Teucrium arduini.

- » *chamædrys.*
- » *creticum.*
- » *lucidum.*
- » *marum.*
- » *montanum.*
- » *polium.*
- » *pyrenaicum.*
- » *Scorodonia.* Excellent p^r sous-bois.

Thalictrum aquilegifolium.

Le délicat Pigamon aux élégants.

panicules lilas.

- » *alpinum.*
- » *Baïkalense.*
- » *caucasicum.*
- » *cornuti.*
- » *dioicum.*
- » *foetidum.*
- » *minus.*

Jolie verdure fine et gracieuse.

- » *polygamum (Color).*
- » *saxatile.*
- » *squamosum.*
- » *trigynum.*
- » *turkestanicum.*

Thermopsis caroliniana.
 » *Fabacea*.
 » *montana*.
 » *rhombifolia*.
Thladiantha dubia.
Thlaspi brevistyla.
 » *densiflorum* (Chypre).
 » *Kowatzi*.
 » *Lereschii*.
 » *microstyla*.
 » *rotundifolium*.
 » *violascens*.
Thymus serpyllum.
Tiarella cordifolia (jolie pl. d'ombre).
Tofieldia calyculata.
 » *glacialis*.
Tolmiea Menziesii.
Tommasinia purpurascens.
 » *verticillaris*.
Tournefortia elegans.
 » *heliotropioides*.
Towsendia grandiflora (Color.).
 » *sericea* (Color.).
Tricyrtis hirta (Jap.).
Trientalis europea.
Trifolium alpestre.
 » *alpinum*.
 » *Badium*.
 » *ochroleucum*.
 » *pannonicum*.
 » *rubens*.
 » *saxatile*.
 » *spadiceum*.
Trillium atropurpureum.
 » *cernuum*.
 » *grandiflorum*.
 » *pendulum*.
 » *sessile*.
Triosteum pinnatifidum.
Trollius altaicus.
 » *americanus*.
 » *asiaticus*.
 » *aurantiacus*.
 » *caucasicus*.
 » *europæus*.
 Le beau « Globe d'or » des rég.
 mont. qu'on élève et cultive faci-
 lement. Il fleurit abondamment
 si on lui donne un sol sain et une
 situation un peu fraîche. On en
 fait aussi de merveilleux bords
 d'étangs ou ruisseaux.
 » *hybridus*.
 » *japonicus*.
 » *ledebourii*.
 » *Transylvanicus*.
Tunica olympica.
 » *saxifraga*.

Umbilicus semenovi (v. en outre *Coty-
 ledon*).
Uniola latifolia.
Vaccinium Myrtillus (*Myrtille*).
 » *oxycoccus*.
 » *pennsylvanicum*.
 » *uliginosum*.
 » *Vitis-Idæa* (*Airelle*).
Valeriana alliariæfolia.
 » *alpestris*.
 » *celtica*.
 » *exaltata*.
 » *flaccidissima* (Jap.).
 » *globulariæfolia*.
 » *montana*.
 » *officinalis*.
 » *Phu*.
 » *pyrenaica*.
 » *Saliunca*.
 » *sambucifolia*.
 » *septentrionalis* (Etats-Unis).
 » *supina*.
 » *tripteris*.
Veratrum album.
 » *californicum*.
 » *nigrum*.
Verbascum Blattaria.
 » *giganteum*.
 » *gnaphalodes*.
 » *Hænkei*.
 » *montanum*.
 » *Olympicum*.
 » *Phœniceum*.
 » *Thapsus*.
 » à fl. blanches.
 » *Thapsiforme*.
Verbena venosa (*Verveine rustique*).
Veronica Allionii.
 » *alpina*.
 » *aphylla*.
 » *Bachofenii*.
 » *Balcana*.
 » *bellidioides*.
 » *caucasica*.
 » *Chamædrys*.
 » *dentata*.
 » *filifolia*.
 » *fruticulosa*.
 » *gentianoides*.
 » *incana*.
 » *maritima*.
 » *maxima*.
 » *multifida*.
 » *nummulariæfolia*.
 » *orientalis*.
 » *parviflora*.
 » *pectinata*.
 » *peduncularis*.

*Vaccinium Prenja.**Veronica prostata.*

- » rupestris.
- » satureyoides.
- » saxatilis.
- » serpyllifolia.
- » sibirica.
- » spicata.
- » à fl. blanches.
- » Teucrium.
- » urticæfolia.
- » virginica.

Vesicaria græca (Grèce).

- » sinuata.
- » utriculata. Belle esp. à fl. jaunes.
à planter dans les fentes de rochers.

Vicia dumetorum.

- » Onobrychioides.
- » Orobus.

Vincetoxicum japonicum (Jap.).

- » nigrum.
- » rubrum.

Viola adunca.

- » alpestris.
- » altaica.
- » alpina.
- » arenaria.
- » atlantica.
- » biflora.
- » calcarata.
- » à fl. blanches.
- » à fl. jaunes.
- » à fl. violet foncé.
- » à fl. tricolores.

Viola canadensis.

- » canina alba.
- » cenisia.
- » cognata (Etats-Unis).
- » cornuta.
- » à fl. blanches.
- » var. Papilio.
- » cucullata.
- » declinata.
- » delphinifolia (Etats-Unis).
- » elatior.
- » heterophylla.
- » heterophylla.
- » Jovi.
- » latisejala.
- » lutea.
- » Munbyana.
- » Nuttali.
- » olympica.
- » palmata.
- » Patrini.
- » pedata.
- » pinnata.
- » pinnatifida (Etats-Unis).
- » prionantha.
- » rothomagensis (vrai).
- » Rydbergii (Etats-Unis).
- » Zoyzii.

Vittadenia australis.

- » triloba.

*Wahlbergella affinis.**Waldstenia fragarioides.**Wilkiea Mutzura (Grèce).**Wulfenia carinthiaca.**Zauschneria californica.*

Graines de plantes vivaces d'ornement.

Pour les plantes vivaces.

Les plantes vivaces, qui furent les premières fleurs que l'on introduisit dans les jardins, ont été refoulées à l'arrière-plan par les brillantes exotiques pour lesquelles on a dû construire des serres et des couches chaudes et qu'on a dû acclimater à force de frais et de soins. Abandonnées par le gros public elles sont restées l'apanage des gens de goût et des amateurs de belles choses ; les artistes, les littérateurs, les amis du Beau et du Vrai reviennent aux plantes vivaces avec une ferveur digne de remarque. Ce sont leurs fleurs qui envahissent l'atelier du peintre et le cabinet de l'homme de lettres. Et ce sont les plantes vivaces, ces bonnes filles des zones froides ou tempérées, enfants souvent des frimas et des monts, qui servent les desseins de l'architecte paysagiste de notre époque. On en a assez des mosaïques qui sont une aberration du bon goût et la négation de l'art ; on ne veut plus de ces corbeilles multi ou unicolores, gros pâtés colorés qui offusquent la vue de celui qui voue un culte aux belles choses ou au naturel. On leur préfère l'élégante silhouette d'une plante herbacée vivace dont les fleurs solides et innombrables sont une précieuse ressource pour les bouquets ou l'arrangement des intérieurs.

Inondez vos salons et vos chambres de travail de ces flots colorés et parfumés ; que les fleurs animent vos maisons et poétisent votre existence et que, chaque jour, leurs charmes discrets élèvent vos âmes et agrémentent votre existence.

Pour cela, plantez d'espèces vivaces vos plates-bandes et vos massifs ; détruisez les corbeilles monstrueuses et animez vos pelouses en plantant ici et là, des touffes d'Anémones, d'Asters, de Kniphophias, de Delphinium, de Rudbeckias, etc. ; plantez partout de ces belles plantes vivaces qui ne demandent sinon qu'on coupe leurs tiges à l'automne et qu'on les laisse vivre en paix, donnant à foison fleurs et parfums sans rien exiger du jardinier.

Acanthus mollis.

» *spinosus.*

Achillea filipendula.

Mille-feuilles à fleurs jaunes.

Agrostemma coronaria.

(Coquelourde, plante très florifère et solide, à nombreuses fleurs d'un carmin vif).

Althæa rosea.

Rose trémière à fl. simples, var. à fl. blanches, jaunes, blanc crème, roses, rouges ou brunes, séparées ou mélangées.

Alyssum saxatile (Corbeille d'or).

Anaphalis margaritacea (Immortelles blanches).

Anchusa Barrelieri.

» *italica.*

» *officinalis.*

» *sempervirens.*

Anemone japonica.

» *sylvestris* à grandes fleurs.

(Très belle esp. de cult. facile).

Antirrhinum majus (Gueule de loup).

» var. *atrosanguinea.*

Aquilegia alba (Ancolie blanche).

» *californica* (rouge et jaune).

» *hybrida.*

» *canadensis.*

» " *nana.*

Nombreuses fleurs d'un beau rouge cinabre.

» *chrysantha.*

Fleurs jaunes à très longs éperons.

» *chrysantha bicolor.*

» *cœrulea.*

» " *lutea.*

» *flabellata nana.*

Pl. japonaise naine à nombreuses fl. blanches ; très précoce.

» *glandulosa rosea.*

» *Haylodgensis.*

Très belles var. anglaises à grandes fl. multicolores.

» *hybrida.*

Var. à grandes fl. de teintes très variées et brillantes.

Gentiana Jetschani, fl. rouge et jaune.

» *nivea grandiflora*.

» *vulgaris*.

Les *Ancolies* sont excell. pour la garniture des endroits frais, des sous-bois pour émailler les pelouses, pour plates-bandes ou rochers. Leur abondante floraison, l'élégance de leurs fleurs, leurs couleurs vives et variées, et surtout le fait qu'elles sont robustes et de cult. extrêmement simple les recommandent à tous. Leurs graines germent de suite.

Arabis albidia (corbeille d'argent).

Archangelica officinalis.

Asclepias Cornuti.

» *Hallii*.

» *incarnata*.

» *purpurascens*.

» *speciosa*.

» *tuberosa*.

Bonnes pl. vivaces florif. et solides.

Asphodelina cretica.

» *taurica*.

Aster bessarabicus.

Très belles espèces à nombreuses fl. bleu et or.

» *Curtisii*.

» *ericoides*.

» *foliaceus*.

» *japonicus*.

» *laevis*.

» *leucanthemus*.

Porteri (Aster nain à fl. blanches, fleurissant d'août en novembre).

» *pumilus*.

» *simplex*.

» *subcœruleus*.

» *turbinellus*.

Astilbe Lemoinei.

» *Thunbergi*.

Bocconia (Macclaya) cordata.

» *japonica* (Jap.).

» *microcarpa*.

Boltonia glastifolia.

Calystegia dahurica (liseron rose vivace).

Camassia esculenta.

» *Cusickii*.

Campanula Alliarisæfolia.

Belle pl. à grandes fl. blanches, penchées, formes élégantes.

» *carpathica*.

Excellente pour bordures et former des tapis.

Campanula former à fl. blanches.

» *eryocarpa*.

Très belle et grande esp. à grandes fl. bleu-violet.

» *macrantha*.

Espèce à très grandes fleurs.

» *Medium*. (Camp. carillon ; bisann.).

» var. *calycantha*.

» *nobili-macrantha*.

» *persicæfolia*.

» *primulæfolia*.

» *pyramidalis*.

Pl. excellente pour garnir les vieux murs, les grands rochers, les graviers, les pentes arides, au soleil. Elle fleurit de juillet-août en novembre et constitue une des meilleures pl. d'ornement dant les jardins alpins ou les plates-bandes. Culture facile.

Camp. pyramidalis à fl. blanches.

» *strigosa*.

» *tomentosa*.

Catananche cœrulea.

Centaurea Babylonica.

Très haute espèce fl. jaune orangé.

» *macrocephala*.

Bonne espèce à gros capitules jaunes.

Centranthus ruber.

C'est la Barbe de Jupiter ou Valériane rouge vif, l'une des plus recommandables pl. d'ornement. Fait admirablement dans les fentes des murailles.

Centranthus ruber à fl. blanches.

» à fl. rouge très foncé.

Cheiranthus Cheiri.

Chelone barbata.

» *hybrida*.

» *glabra alba*.

» *obliqua*.

» *Torreyi*.

Les chélonas sont d'excellentes pl. vivaces aux fl. rouge vermillon ou carmin ou rose, etc., de culture facile et dont les graines germent avec facilité.

Chrysanthemum caucasicum.

» *lacustre*.

» *maximum*.

Clematis integrifolia.

» *recta*.

» *stans*.

Coreopsis auriculata.

» *grandiflora*.

» *lanceolata*.

Coreopsis tripteris.

» *verticillata.*

Excellentes pl. d'ornem. très florifères ; grandes, d'un jaune vif, se succédant de juillet en novembre. Cult. facile.

Crambe aspera.

» *cordifolia.*

» *kotschyana.*

» *maritima.*

» *pinnatifida.*

» *tatarica.*

Crucianella stylosa, très jolie pl. tapis-sante : fl. roses.

Delphinium altissimum.

» *azureum* (d'un azur très pur).

» *var. albidum.*

» *cheilanthum.*

» *Chinense* (du plus beau bleu).

» » à fl. blanches.

» » à fl. roses.

» *consolida* (annuelle).

» » de plusieurs couleurs.

» *Formosum* (esp. superbe d'un bleu intense).

» *grandiflorum.*

» » à fl. blanches.

» *hybridum.*

Mélanges des meilleures var.

» *intermedium.*

» *superbissimum* (indigo).

Delphinium Tatzuense.

» *villosum.*

Les Dauphinelles ou pieds d'alouettes vivaces sont d'entre les meill. de pl. d'ornement Cult. facile et flor. prolongée si l'on a soin de couper les tiges après la floraison.

Dianthus barbatus (œillet des poètes).

» *var. à fl. brun noir.*

Dianthus plumarius.

Excellente pl. pour garnir les talus, les murs, les lieux arides ; fl. abondantes et très odor. se succédant tout l'été. Elle s'élève facilement de graines.

Digitalis purpurea.

» *purpurea alba.*

Les Digitales sont de bonnes pl. à fl. nombreuses grappes dressées ; cult. facile.

Echinacea intermedia.

» *purpurea.*

Excellente pl. vivace s'élevant de 60 à 80 cm. et produisant pendant cinq ou six mois de grandes marguerites d'un rouge

vin foncé ; bonne pour les bouquets.

Echinops Ritro.

(Gros chardon bleu de forme sphérique).

» *niveus.*

» *spherocephalus* (le même en lilas).

Eremostachys laciniata.

» *iberica.*

Erigeron speciosus.

Grand aster bleu vivace.

Eryngium giganteum.

Pl. de teinte gris plomb.

» *creticum.*

Involucre, épis et tiges bleu foncé.

» *planum.*

Fl., involucre, et tiges d'un bleu violacé : on la sèche pour bouquets d'hiver.

Tous ces *Eryngium* ont l'aspect de Chardons bleus, bien qu'ils appartiennent aux ombellifères. Ce sont d'excellentes pl. d'ornement, propres à garnir les lieux arides.

Eschscholzia aurantiaca.

Papavéracée bisannuelle et très florifère qui se sème naturellement dans les plates-bandes ou les graviers et fleurit toute l'année, même l'hiver quand il n'est pas très rigoureux.

Eupatorium ageratoides.

Bonne pl. viv. à fl. blanc pur ; florais. prolongée ; cult. facile.

» *altissimum.*

» *cannabinum* à fl. blanches.

» *chinense* (Jap.).

» *japonicum* (Jap.).

» *serotinum.*

Festuca Crinum-Ursi.

Le meilleur gazon propre à résister aux sécheresses).

Funkia coerulea.

Gaillardia aurantiaca.

» *grandiflora.*

» *maxima.*

Les Gaillardes sont d'excellentes pl. d'ornement, à grandes fleurs jaune et rouge, fleurissant abondamment tout l'été.

Galega officinalis.

» *orientalis.*

» *persica.*

Solides Papilionacées à floraison prolongée.

Galtonia candicans.

Grande Jacinthe vivace à fl. blanc pur.

Gaura Linheimeri.

Excellente pl. d'ornement qui fleurit pendant tout l'été et supporte les plus fortes sécheresses.

Geranium pratense.

Bonne espèce très rustique et très florifère.

Geum coccineum.

Superbe pl. à fl. d'un rouge vermillon.

» cocc. var. *atrosanguineum.*

» » var. à fl. doubles.

» *Heldreichii.*

Ces Benoites à fl. rouge vif, sont de semis et cult. faciles, et réussissent bien dans les sols sains, fleurissent de mai en octobre.

Glaucium luteum (Pavot à fl. jaune et à feuillage argenté, très ornemental).

Grindelia cuneifolia.

» *humilis.*

» *patens.*

» *robusta.*

Grindelia squarrosa.

Très belles composées à grands capitules jaune soufre, excellentes pl. d'ornement et bonnes pour bouquets.

Gutierrezia Euthamiae.

Excell. petite pl. arbuscule se couvrant, de juillet-octobre, de fl. jaune vif, solide.

Gypsophila paniculata. (L'une des meilleures pl. vivaces pour la fleur coupée; très solide et longuement florifère).

Hablitzia tamnoides.

Hedysarum coronatum.

Heleniastrum puberulum.

Helenium autumnale.

» *Hoopesii.*

» *montanum.*

Helianthemum mélangés de toutes couleurs.

Excellentes pl. basses, très florif., dont nous avons une collection complète (voir p. 10). Il en est de toutes teintes et couleurs. Elles sont faciles à élever de gr. et très ornementales.

Helianthus maximilianus.

» *pumilio.*

» *rigidus.*

» *strumosus.*

Heliopsis laevis.

Heliopsis pitcherianus.

» *scabra.*

Helleborus niger (Rose de Noël).

Hemerocallis graminea.

Heracleum giganteum.

» *Mantegazzianum.*

Les *Her.* sont des pl. d'ornement aux formes architecturales et propres à garnir les lieux sauvages et pittoresques. Ils aiment la fraîcheur et la mi-ombre.

Hesperis matronalis (Girarde odorante).

» *tristis.*

Heuchera sanguinea.

» » à fl. blanches.

Hibiscus militaris.

» *palustris.*

» *roseus.*

Superbe pl. d'ornement aux très grandes fl. roses.

Humulus Lupulus (Houblon).

Iberis Gibraltarica hybrida.

Très bonnes pl. à fl. lilas ou blanches, excellentes p. la décoration des rochers ou des vieux murs.

» *sempervirens.*

Iberis sempervirens nana.

Incarvillea Delavayi.

» *grandiflora.*

» *Olgæ.*

» *variabilis.*

L'Inc. *Delavayi* est l'une des meilleures acquisitions de l'horticulture depuis quelques années; belle pl. à très grandes fl. roses ressemblant à des *Gloxinias*, nombreuses et bonnes pour bouquets; juin-août. Plante solide; soleil; vient facilement de graines.

Ipomæa leptophylla.

» *pandurata.*

Beau liseron vivace très rare dans les cultures.

Iris albida.

» *ensata.*

» » var. *chinensis* (Jap.).

» *foetidissima.*

» *gigantea.*

» *lævigata Kampferi* (Jap.).

» *leucantha* (Jap.).

» *lutescens.*

» *missouriensis* (Color.).

» *Mongolica* (Jap.).

» *pseudo-acorus.*

» *pyrenaica.*

» *sibirica.*

Jolie pl. aux nombreuses fl. bleu

foncé.

Iris sibir. v. fl. alte cœrulea (Jap.).

» v. à fl. blanches (Jap.).

» v. *orientalis* (Jap.).

» *sisirinchium*.

» *versicolor*.

» *virginica*.

Lathyrus latifolius (Pois. à fl. vivace).

» à fl. blanches.

Lepachys columnaris.

Leucanthemum maximum.

» var. Prinz.

Heinrich.

Leucocœjum æstivum.

» *vernum* (nivéole).

Liatris elegans.

» *dubia*.

» *punctata*.

» *pyncnostachya*.

» *scariosa*.

» *spicata*.

Pl. d'ornement de grande valeur.

Linum perenne.

» fl. blanches.

Linum perenne à fl. roses.

Les *Linum perenne* sont de délicieuses pl. à floraison gracieuse et presque permanente; cult. facile.

» *sibiricum*.

Lobelia cardinalis.

» *fulgens*.

» *Gerardi*.

» *speciosa*.

» *syphilitica*.

Lophanthus anisatus.

Labiée à la forte odeur d'anis.

» *rugosus*.

Lunaria biennis.

» à fl. blanches.

(Monnaie du Pape.)

Lynchis chalcedonica.

» à fl. blanches.

» à fl. roses.

» *fulgens*.

Fl. grandes et brillantes: culture facile; belle pl. ornementale.

» *Haageana*. Fl. rose-saumon.

» *Sieboldi*.

» *Viscaria*.

» var. à fl. blanches.

» var. *splendens*.

Les *Lynchis* sont de bonnes pl. d'ornement très florifères. Ils s'élèvent avec facilité par semis et sont de culture très aisée.

Maclaya cordata.

» *microcarpa*.

Connues également sous le nom de *Bocconia*, ces pl. sont d'entre

les meilleures pl. vivaces à feuillage ornemental. Elles font merveille, isolées dans les pelouses ou pour la décoration des jardins pittoresques.

Monarda fistulosa (*thé d'Oswego*).

» *purpurea*.

Les *Monardes* sont d'excellentes pl. vivaces, odoriférantes, très rustiques et florifères; fleurs ornementales et bonnes pour les bouquets.

Morina Coulteriana.

» *longiflora*.

Obeliscaria columnaris.

» *pulcherrima*.

Onopordon bracteatum.

Pl. superbe, épineuse, à fl. d'argent, à formes architecturales, propres à isoler dans les gazons.

» *Illyricum*.

Onopordon sibthorpiatum.

Onothera macrocarpa.

Pl. basse et trainante, à très grandes fl. jaunes fleurissant 4 ou 5 mois durant; cult. facile.

Pæonia albiflora.

» *anomala*.

» *coralina*.

» *decora* (*romantica*).

» *lobata*.

» *officinalis*.

» *peregrina*.

» *tenuifolia*.

» *triternata*.

Les *Pivoines* types sont de très belles pl. d'ornement. Leurs graines germent toujours mais seulement au bout d'une année.

Pancratium maritimum.

Papaver involucreatum.

Enorme fl. d'un rouge éclatant.

» *maximum*.

Très belles fl. mesurant plus de 30 cent. de diamètre; pétales d'un rouge sang très ardent; la plus décorative et la plus richement colorée des pl. vivaces.

» *Orientale*.

Très gros pavot rouge, pl. à grand effet; de culture extrêmement facile; lève bien des graines.

» *Orientale* var. *Blush Queen* à fl. lilas clair.

» var. *Mahony*. D'un rouge très foncé.

» var. *hybrida*.

Papaver nudicaule (Pavot d'Islande).

Le Pavot d'Islande est peut-être la meilleure des pl. vivaces, car la fl. en est gracieuse et très apparente et se conserve longtemps dans l'eau ; en outre la plante fleurit pendant une bonne partie de l'année, à l'ombre ou au soleil. Elle préfère les sols légers et pierreux aux sols argileux mais va partout assez bien. Elle s'élève avec facilité par semis.

» *splendidissimum*.

Très belle espèce à grandes fl. rouges.

Pentstemon acuminatus.

» *albus*.

» *alpinus*.

» *atropurpureus*.

» *campanulatus*.

» *carinatus*.

» *caeruleus*.

» *cobaea*.

» *confertus*.

Pentstemon cordifolius.

» *cyananthus*.

» *diffusus*.

» *digitalis*. Excellente pour la fl. coupée.

» *Eatoni*.

» *glaber*.

» » *var. alpinus*.

» » à fl. rouges.

» *glaucus*.

» *gracilentus*.

» *gracilis*.

» *Hartwegi*.

» *heterophyllus* (d'un bleu superbe).

» *humilis*.

» *Jamesii*.

» *laevigatus*.

» *linarioides*.

» *Mackayanus*.

» *Menziesii*.

» *ovatus*.

» *procerus*.

» *pubescens*.

Fl. très nombreuses, de teinte opale se succédant tout l'été.

» *puniceus* (rouge, vermillon ardent).

» *pygmaeus*.

» *Richardsonii*.

» *rubricaulis* (Californie).

» *secundiflorus*.

» *speciosus*.

» *spectabilis* (Etats-Unis).

» *Watsoni* (Etats-Unis).

» *Wrightii*.

Les *Pentstemon* sont de bonnes pl. vivaces de plates-bandes ou de rochers. qui fleurissent longtemps et sont très ornementales. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison ; leurs fl. sont d'entre les meilleures pour les bouquets.

Phlomis Samia.

Belle plante d'ornement à fl. jaune clair et orange.

Phlox decussata.**Phygelius capensis.****Physalis Alkekengi (Coqueret).**

Excellente pl. à gros fruits baciformes et entourés d'une belle vésicule rouge brique vif, qu'on conserve pour les bouquets d'hiver.

» *Franchetti*.

» *lobata* (Color.)

Physotegia speciosa alba.

» *virginiana*.

Très belle pl. vivace à fl. lilas rose.

Phytolacca decandra.

» *dioica*.

Platycodon glaucum (Jap.).

Platycodon grandiflorum.

» » *nanum*.

» *Mariesi*.

» *Mariesi major*.

» à fl. blanches.

Superbes campanules à grandes fl. ornementales, fleurissant de juillet en automne, de culture facile et excellentes pour bouquets.

Polemonium coeruleum.

» » à fl. blanches.

Les pol. sont des pl. robustes et très florifères, des plus faciles à élever et à cultiver ; fl. nombr. odorantes et précieuses pour bouquets.

Polygonum Baldschuanicum (grimp.).

» *cuspidatum*.

» *molle*.

Potentilla atropurpurea.

A fl. d'un rouge très foncé ; belle pl. très florifère ; culture facile.

» *chrysantha* (jaune d'ocre).

» *Hortensis*.

Les meilleures variétés horticoles.

Primula acaulis vars.

» *Auricula* vars.

Les meilleures auricules des jardins anglais.

» *japonica*.

Excel. pl. très fl. et propre à garnir les lieux frais.

Rheum collinianum.

» *Emodi*.

» officinale.

» palmatum.

» *Tanguticum*.

Rosmarinus officinalis (Romarin).

Rudbeckia ampla (Etats-Unis).

» *californica*.

» *flava*.

» *fulgida*.

» *hirta*.

» *hybrida variabilis*.

» *intermedia*.

» *laciniata*.

» *nitida*.

» *pinnata*.

» *purpurea*.

Très belle esp. à fl. rouge foncé, fleurissant de juillet en octobre-novembre; fl. excellentes pour les bouquets.

» *speciosa*.

Ce sont d'excellentes pl. viv. solides très fl. et dont les capit. jaune avec centre noir ou rouge foncé font le plus grand effet. Très bonne pour la fl. coupée et longue conserv. dans l'eau.

Silene Asterias (très belle esp. à fl. rouge vif).

Silphium asteriscus.

» *doronicæfolium*.

» *laciniatum*.

» *lanceolatum*.

» *perfoliatum*.

» *Terebinthinum*.

Solidage canadensis.

» *gracilis*.

» *Shortii*.

Statice latifolia.

Excellente pl. viv. à large panic. de fl. bleues qu'on peut conserver

pour l'hiver; fl. à bouquets de premier ordre.

Statice Gmelini.

Tanacetum macrophyllum.

Pl. à grandes formes; énormes cap. de fl. blanches.

» *vulgare*.

Telekia speciosa.

Le *Telekia* est l'une des plus solides et des plus précieuses pl. viv. d'ornement; grand feuillage architect. et beaux capitules d'or. fortement aromatiques.

Thladiantha dubia. Sorte de courge vivace aux fl. jaunes, auxquelles succèdent, chez la pl. femelle, des fruits rouge vif.

Tradescantia virginica.

Verbascum Gnaphalodes (feuill. blanc et floconneux).

Verbascum Henkii.

Molènes à fl. rougeâtres.

» *Lychnitis*.

» *Olympicum*.

Pl. décorative très élevée, avec belles fl. grises, fl. jaunes nombr. » *phoeniceum*.

» *vars.*

Charmant Molènes à fl. violet foncé, blanches ou roses très florif.

Vernonia altissima.

» *Arkansana*.

» *drummondioides*.

» *gigantea*.

» *glauc*.

Compos. à grandes panic de fl. violet foncé.

Veronica grandis.

» *longifolia*.

» *maxima*.

» *paniculata*.

» *sibirica*.

» *subsessilifolia*.

Yucca angustifolia (Color).

» *glauc* (Color).

Graines d'arbustes de rocailles et de plantes grimpantes.

Amorpha nana.
Ampelopsis nepalensis.
 » *Veitchi.* (Petite vigne vierge japonaise).
Amygdalus nana.
Aronia melanocarpa.
 » *floribunda.*
Berberis aristata.
 » *repens.*
 » *maximowiczii* (Jap.).
 » *Thunbergiana* (Jap.).
 » *umbellata* (Sikk.).
 » *vulgaris* (épine-vinette).
Betula nana (le petit bouleau nain du cap Nord).
Budleya variabilis.
Bupleurum fruticosum.
Calophaca Wolgarica.
Calycanthus præcox.
Caragana altagana.
 » *jubata* (Turkestan).
 » *microphylla.*
 » *pygmaea* (Thibet).
Cariopteris divaricata.
 » *mastacanthus.*
 » à fl. blanches.
Carmichaelia australis (Sydney).
Carpinus cordatus.
Cassia Marylandica.
Celastrus articulatus.
 » *orbiculatus* (Jap.).
Cistus albidus.
 » *ladaniferus.*
 » *laurifolius.*
 » *monspeliensis.*
 » *salvifolius.*
 » *villosus.*

Les Cistes sont de charmants arbrisseaux méditerranéens qui se couvrent de fleurs d'églantines roses, carmin ou blanches et produisent un grand effet. Tous ne

sont pas rustiques sous le climat de Genève ou Paris, mais ils le sont dans l'ouest et en Angleterre.

Clematis Davidiana.

» *Douglasi* (Etats-Unis).
 » *Fremonti.*

» *superba.*
 » *graveolens.*

Très curieuse Clématite grimpante portant des milliers de fleurs jaunes pendant tout l'été.

» *ligustifolia.*

» *montana.*

» *Pitcheri.*

» *recta.*

» *Stans.*

» *tubulosa.*

» *verticillaris.*

» *columbiana.*

» *virginiana.*

» *Viticella.*

L'ancienne petite clématite violette.

» *Vitalba.*

C'est la clématite sauvage des bois et des haies ; elle fait admirablement dans nos jardins et se recommande comme pl. grimpante de grande valeur à cause de sa rusticité à toute épreuve, de sa croissance rapide qui égale presque celle de la Glycine et aussi par ses fleurs et ses graines qui sont hautement décoratives.

Colutea arborescens.

» *cruenta.*

Coronilla Emerus.

Cotoneaster acutifolia.

» *Davidiana* (*horizontalis*).

C'est le meilleur des arbustes de rocailles ; ses branches s'étalent sur le sol en larges raquettes ou

palmettes garnies de jolies feuilles luisantes et se couvrant littéralement de fl. roses, puis de baies rouges vif qui persistent l'hiver. La graine lève facilement.

Cotoneaster frigida.

- » *glacialis.*
- » *microphylla.*
- » *nummularia.*
- » *pannosa.*

Excellent arbuste, gracieux et gai, introduit dernièrement du Yun-Nan.

- » *Thymifolia.*

A très petit feuillage persitant, vert foncé luisant.

- » *tomentosa.*
- » *vulgaris.*

Cytisus albus.

- » *alpinus.*
- » *austriacus.*
- » *capitatus.*

Excellent arbrisseau de 1 m. à 1 m. $\frac{1}{2}$, qui se recouvre de fl. jaunes pendant une bonne partie de l'année.

- » *caramanicus* (Orient).
- » *hirsutus.*
- » *Laburnum.*
- » *leucanthus.*
- » *nigricans.*
- » *purpureus.*
- » *radiatus.*
- » *scoparius.*
- » *Schipkaensis.*
- » *sessilifolius.*

Daphne alpina.

- » *caucasica.*
- » *cneorum.*
- » *Gnidium.*
- » *Laureola.*
- » *mazereum.*
- » *striata.*
- » *verloti.*

Daphniphyllum macropodum (Jap.).

Desmodium japonicum (Jap.).

- » *laburniflorum* (Jap.).

Forsythia europaea.

Genista aetnensis.

- » *Andreana.*
- » *anglica.*
- » *austriaca.*
- » *cinerea* (des Alpes provençales).
- » *germanica.*
- » *hispanica.*
- » *horrida.*

Charmant arbuste de rocailles

restant très bas et se couvrant de fleurs jaunes.

Genista juncea.

Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.

- » *pilosa.*
- » *radiata.*
- » *sagittalis.*
- » *sibirica.*
- » *tinctoria.*

Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil. Floraison prolongée, pl. solides.

Halesia hispida (Jap.).

Halimodendron argenteum.

Hamamelis virginica.

Hedera chrysocarpa (Lierre à fruits jaunes).

Hippophaë rhamnoides (Argousier).

Idesia polycarpa.

Illicium anisatum (Jap.).

Jamesia americana.

Juniperus cedrus (Ténériffe).

- » *communis.*
- » *nana* (Genevrier traînant des Alpes).
- » *prostrata.*
- » *Sabina* (La Sabine des Alpes).

Kadsura japonica (Jap.).

Kerrya japonica.

Lespedeza bicolor.

Ligustrum japonicum (Jap.).

- » *regelianum.*

Lonicera alpigena (Chèvrefeuille des Alpes).

- » *cœrulea* (Ch. f. alpin à fruits bleus).

Lonicera japonica (Jap.).

- » *nigra* (Chèvref. des Alpes à fruits noirs).
- » *pyrenaica* (vrai).

Lycium barbarum.

- » *chinense* (Jap.).

Excellent arbr. traînant, propre à garnir des rampes et pentes rapides et sèches.

Maclura aurantiaca.

Malotus japonica.

Myricaria germanica.

Paederia tomentosa.

Paliurus aculeatus.

Jolis arbustes, épineux, à forme gracieuse et propre à former des haies.

Phellodendron amurense.

Picrasma Quassioides (Japon).

Pinus Cembro (Pin d'arole).

- » *pumilis*.
- » *uncinata*.

Polygonum Baldschuanicum.

Pl. grimpante turkestane de grande valeur décorative et très florifère.

Prunus Brigantia (du Haut-Queyras).

Pyrus nigra Petit arbuste des rochers aux feuilles rougissant à l'automne, aux nombreuses baies noires.

Rhamnus dahurica.

- » *pumila*.

Rhaphiolepis japonica (Jap.).*Rosa alpina*.

- » *altaica*.
- » *dalmatica*.
- » *Fortunei* (Jap.)
- » *Jundzillii*.
- » *microcarpa*.
- » *microphylla* (Jap.).
- » *multiflora*.
- » *pimpinellifolia*.
- » *rubiginosa* (Sweet bryar).
- » *serafini*.

Rosa sericea.

- » *Thea* (type).

Rosmarinus officinalis.*Rubus laciniatus*.

- » *leucodermis*.
- » *Xanthocarpus*.

Ruscus aculeatus (*Buis ardent*).

- » *racemosus*.

Sambucus racemosa.*Sarothamnus scoparius*.*Smilax aspera*.*Sophora flavescens* (Jap.).*Sorbus aucuparia*.

- » *chamæmespilus*.

Spartium junceum.*Ulex europæus*.*Xanthoceras sorbifolia*.*Zanthoxylon ailanthoides* (Jap.).

- » *alatum* (Jap.).
- » *Bungei*.
- » *inerme* (Jap.).
- » *planispinum*.
- » *piperitum* (Jap.).
- » *schinifolium* (Jap.).

Zelkova acuminata (Jap.).*Zyziphus vulgaris*.

Graines de Cactées rustiques

(Résistant aux hivers du centre européen).

Echinocereus viridiflorus.

- » viviparus (Color.).

Mammillaria missouriensis.

- » vivipara.

Opuntia arborescens.

- » albospina (Color.).
- » arenaria.
- » arkansana.
- » Camanchica.
- » cymochila.
- » fragilis (Color.).
- » fulgens (à fl. rouge vif).
- » gigantea (Color.).
- » Greeni.
- » hybrida.

Opuntia macrorhiza.

- » mesacantha.
- » missouriensis.
- » phæacantha.
- » polycantha.
- » " albospina.
- » " major.
- » Raffinesquiana.
- » Salmonea (fl. rouge saumon).
- » spinacantha.
- » vulgaris.
- » Xanthostemma.
- » elegans (à fl. roses).
- » rubra (à fl. rouges).

Les Cactées ci-dessus lèvent facilement de graines et sont rustiques à nos hivers. Il suffit de tenir les plantes au sec (recouvertes de planches inclinées) pendant la mauvaise saison. Elles fleurissent abondamment l'été si l'on a soin de les planter au grand soleil. En Allemagne on en cultive de grandes collections sans même les recouvrir de planches.

IMPRIMÉ



Monsieur Henry CORREVON

FLORAIRE

CHÊNE-BOURG.

GENÈVE (Suisse).

Le soussigné déclare souscrire à exemplaire
de l'ouvrage Les Iris dans les Jardins pour le prix de
3 fr. 50 l'exemplaire, qui sera envoyé contre rembourse-
ment postal.

Signature :

Adresse exacte :

.....

.....

Graines reçues de Sydney.

Acacia aneura.
» Beileya.
» elongata.
» leptoclada.
» longifolia var. Floribunda.
» neriifolia.
» Oswaldi.
» penninervis.
Angophora lanceolata.
Calliandra Tweedii.
Calodendrum capensis.
Cordyline obtecta.

Daphnandra micrantha.
Elacodendron australe.
Eucalyptus crebra.
» rostrata.
» saligna.
Goodia latifolia.
Hibiscus diversifolius.
Labichea lanceolata.
Lagunaria Patersonii.
Phyllota phyllicoides.
Sideroxylon australe.
Stenocarpus sinuatus.

Graines reçues de l'Himalaya

après la mise en page du catalogue.

Anémone polyanthes.
Epilobium tetragonum.
Hypericum monanthenum.
Meconopsis bella.
» grandis.
Potentilla arbuscula.

Potentilla leuconosa.
Pyms rhamnoides.
Saxifraga purpurescens.
Senecis Ligularia.
Trachidium obtusiusculum.

Ouvrages de M. H. CORREVON
EN VENTE CHEZ L'AUTEUR A FLORAIRE

(Les frais de port sont comptés en plus.)

Les plantes des Alpes

Genève 1884. Epuisé.

Les Fougères rustiques.

Ouvrage couronné par la Société d'Horticulture de Genève, la Société d'Horticulture et d'Histoire naturelle de l'Hérault, le Jury de l'exposition internationale de Paris 1890, la Société régionale d'Horticulture de l'Ain, la Société d'Horticulture de Nancy, par des médailles d'or ou d'argent et les félicitations de plusieurs jurys. — Epuisé ; quelques ex. défrachis en vente à **6 fr.**

Les Orchidées rustiques.

Cet ouvrage a été couronné par plusieurs Jurys.

Ouvrage de 250 pages, illustré de 34 gravures. — **Prix : 4 fr.**

Flore coloriée de poche.

A L'USAGE DES TOURISTES

dans les montagnes de la Suisse, de la Savoie, du Dauphiné et des Pyrénées. Epuisé.

En préparation avec la précieuse collaboration
du peintre P. Robert, une édition nouvelle et s'appliquant aux plantes
des montagnes suisses.

Les plantes alpines et de rocailles.

Leur culture et leur acclimatation dans nos jardins.

Un volume relié toile, de 200 pages avec plusieurs illustrations.

Prix : 2 fr. 50.

**Les Fougères de pleine terre,
les Prêles Lycopodes et Sélaginelles rustiques.**

Un volume relié toile, 140 p. avec illust. — **Prix : 2 fr. 50.**

Les Iris dans les jardins.

par MM. H. CORREVON et H. MASSÉ. — Un vol. de 204 pages, avec 9 figures.

Table des Matières :

INTRODUCTION. — CHAP. I. *Rôle superstitieux chez les anciens. Etymologie. L'iris de la mythologie. Propriétés thérapeutiques.* — CHAP. II. *Distribution géographique des iris. Classification.* — CHAP. III. *Distribution des espèces cultivées et des principales variétés.* — 1^{re} série. Iris à rhizomes. 2^{me} série. Iris bulbeux. Iris à tubercules. Les iris Regelio-cyclus. — CHAP. IV. *L'iris dans nos jardins.* Iris des marais. — CHAP. V. *Culture.* Du sol. ESPÈCES BULBEUSES. Plantation. Culture en pleine terre. Culture sous verre. Culture en plein sol sous châssis froid. Culture en pots sous châssis froid et en bêche. Culture forcée. — ESPÈCES A RHIZOMES. Plantation. Culture en pleine terre, soins qu'elle comporte. Culture sous verre. Culture en pots. MULTIPLICATION. Semis. Caïeux. Sectionnement des bulbes. Rhizomes. CULTURE DES IRIS ONCOCYCLUS. Sol. Culture en pleine terre. Culture en pleine terre sous châssis froid. Culture en plein sol, en serre ou en bêche. Culture en pots. Multiplication. — CHAP. VI *Maladies et insectes nuisibles.* Perturbations organiques. Champignon parasite. Insectes nuisibles
VOCABULAIRE. — INDEX.

La Collection des ouvrages de M. CORREVON a obtenu le prix d'honneur
offert par la Société d'horticulture de Neuchâtel
à l'Exposition nationale Suisse, en 1896, et plusieurs médailles d'or, de vermeil
et d'argent dans les Expositions françaises, italiennes et suisses

ALBUM DES ORCHIDÉES DE L'EUROPE CENTRALE ET SEPTENTRIONALE

C'est une collection de 63 planches coloriées et 60 pages de texte contenant la description des espèces représentées, des détails sur leur fécondation par les insectes, sur leur histoire, leur géographie botanique et leur culture dans nos jardins par

H. CORREVON

Prix : 20 francs (port en plus).

ATLAS DE LA FLORE ALPINE

Edition française par H. CORREVON.

Edité par le Club Alpin allemand et autrichien. 500 planches coloriées, admirablement exécutées, en 5 volumes et un volume de texte. — Prix : 75 francs.

FLEURS ET MONTAGNES

Un volume de poésies par H. CORREVON

avec illustrations par Mlle Adèle CORREVON

Genève 1902. — Prix : 2 fr. 50.

Le Jardin de l'Herboriste

Nouvelle édition avec index très complet (110 gravures)

Propriétés et culture des simples et plantes officinales.

Prix : 3 fr. 50.

PAR MONTS ET PAR VAUX

Un volume de 232 pages.

avec nombreuses illustrations de Mademoiselle Adèle CORREVON

Prix : 5 francs.

Nos Arbres.

* Un volume in 8° richement illustré. *

Prix : 7 fr. 50.

Culture des plantes alpines dans le sphagnum
pour les climats méridionaux et secs.

Prix : 1 franc.

Le même en langue italienne : 1 franc.

Imprimerie W. Kündig & Fils. — Genève.